



FUNGICYD



Podkręć skuteczność!

Maxentis®

Uniwersalne, gotowe rozwiązanie
o szerokim zastosowaniu
w zwalczaniu chorób zbóż i zgnilizny
twardzikowej w rzepaku ozimym.

Słuchamy • Rozumiemy • Spełniamy oczekiwania

[ADAMA.COM/Polka](https://adama.com/Polka)



Maxentis

- ▶ dwie substancje czynne dla wyższej skuteczności,
- ▶ szeroki zakres stosowania,
- ▶ długotrwała ochrona,
- ▶ zmniejsza ryzyko pęknięcia łuszczyń i osypywania,
- ▶ efekt zieloności – lepsze wykorzystanie składników pokarmowych oraz wody i ograniczenie negatywnego wpływu stresu na rośliny uprawne,
- ▶ produkt rekomendowany w Integrowanej Produkcji roślin rolniczych.

Maxentis – charakterystyka produktu


Klasyfikacja FRAC	Grupa 3: protiokonazol Grupa 11: azoksystrobina
Skład	protiokonazol 150 g azoksystrobina 200 g
Dawka	0,8-1,0 l/ha
Formulacja	SC – koncentrat stężonej zawiesiny do stosowania po rozcieńczeniu wodą
Uprawy	rzepak ozimy i jary pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto
Zwalczane choroby	rzepak: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych zboża: mączniak, rdze, septorioza liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza, plamistość siatkowa, ramularia
Termin stosowania	rzepak: BBCH 60-69 (faza kwitnienia) pszenica, pszenżyto: BBCH 30-69 (strzelanie w źdźbło – koniec fazy kwitnienia) jęczmień i żyto: BBCH 30-65 (strzelanie w źdźbło – początek kwitnienia)

Maxentis – dwie substancje czynne dla wyższej skuteczności

	Azoksystrobina	Protiokonazol
Grupa FRAC	11	3
Grupa	strobiluryina	DMI
Mechanizm działania	zakłóca procesy oddechowe grzybów	inhibitor biosyntezy ergosteroli
Wpływ na patogena	zakłóca produkcję energii, zwłaszcza w kiełkujących zarodnikach	zakłóca produkcję ściany komórkowej i rozwój grzybni/strzępek
Działanie na patogena	zapobiegawcze	zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające
Działanie na roślinie	lokalnie układowo i translaminarnie	translaminarny, systemiczny (akropetalny)
Długość działania	> 4 tygodni	do 3 tygodni
Warunki do stosowania	temperatura minimalna 8°C	temperatura minimalna 12°C

Maxentis – uniwersalne rozwiązanie w ochronie zbóż

Maxentis 1 l/ha



T1 segment
Wczesne choroby liści

T2 segment
Choroby liści

T3 segment
Choroby kłosa i liści



mączniak



rdze



septorioza liści



fuzarioza kłosów



rynchosporioza



plamistość siatkowa



ramularia

kontrola



Maxentis 1 l/ha

Poziom porażenia kontroli: septorioza paskowana – 6%, rdze – 85%.

Maxentis – inwestycja w plon




zgnilizna twardzikowa




czern krzyżowych

Maxentis 1 l/ha



Plon w stosunku do kontroli (%)



Średni plon kontroli: 3 t/ha.

Zysk z Maxentis vs kontrola: dodatkowe 0,35 t/ha => 815 zł/ha – koszt zabiegu = ok. 670 zł/ha* => ok. 6700 zł/10 ha.

*po uwzględnieniu kosztu zabiegu (koszt produktu + koszt przejazdu) oraz ceny rzepaku 2330 zł/t tydz. 3 wg Sparks.

Źródło: średnia z 12 doświadczeń z Polski.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Dołącz do nas



Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska