

Pendigan® Strong 400 SC

Wygrywa w pierwszej rundzie!

Sprawdzony i niezawodny herbicyd o szerokim zastosowaniu.



herbicyd

NOWOŚĆ!



ADAMA

Pendigan Strong 400 SC

- ▶ jeszcze bardziej skoncentrowany,
- ▶ długotrwały efekt herbicydowy,
- ▶ ogranicza zachwaszczenie wtórne,
- ▶ wyjątkowo szeroki zakres upraw chronionych,
- ▶ doskonały partner do mieszaniny zbiornikowej.

■ Pendigan Strong 400 SC dzięki pendimetalinie oddziałuje najskuteczniej na chwasty w okresie ich kiełkowania oraz podczas wschodów, dzięki czemu może być zastosowany doglebowo lub dolistnie.



Pendigan Strong 400 SC – jeszcze bardziej skoncentrowany

Wysoka koncentracja substancji czynnej w litrze produktu niesie za sobą korzyści w postaci:

- ▶ oszczędności czasu przy przygotowaniu cieczy roboczej dzięki obniżonym dawkom produktu,
- ▶ oszczędności powierzchni magazynowej.

Pendigan Strong 400 SC – długotrwały efekt herbicydowy

Okres połowicznego rozpadu pendimetaliny w glebie (DT_{50}), czyli czas, w ciągu którego ilość substancji czynnej zmniejsza się o połowę, wynosi 64-86 dni. Oznacza to, że Pendigan Strong 400 SC pozostaje

skuteczny w glebie przez kilka tygodni, ograniczając zachwaszczenie wtórne poprzez oddziaływanie na chwasty później kiełkujące.




chwastnica jednostronna



gwiazdnica pospolita



jasnota różowa



jasnota purpurowa



komosa biała



tasznik pospolity



miotła zbożowa



fiółka polny



psianka czarna



szałat szorstki



łoboda




Pendigan Strong 400 SC – wyjątkowo szeroki zakres upraw chronionych

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

Termin stosowania: stosować jesienią, po wschodach zbóż od początku fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Zalecana dawka: 4 l/ha.


Pendigan Strong 400 SC 4 l/ha



Ziemiak


Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Pendigan Strong 400 SC 3-4 l/ha



W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować Pendigan Strong 400 SC w mieszaninie zbiornikowej z Racer® 250 EC.

Racer 250 EC 1,5 l/ha + Pendigan Strong 400 SC 2 l/ha



Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych.


Zabieg wykonać na minimum 7 dni przed wschodami ziemniaka, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, na wilgotną glebę.



Uprawa	Termin stosowania	Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
 Kukurydza	wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13)	4,0 l/ha
 Marchew	po siewie, do fazy gdy kiełek przebija okrywą nasienną (BBCH 00-07)	3,0-4,0 l/ha
 Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior	przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu	3,0-4,0 l/ha
 Cebula uprawiana z siewu	wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liście przebija okrywą nasienną (BBCH 00-07)	3,0-4,0 l/ha
 Cebula uprawiana z dymki	wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki	3,0-4,0 l/ha
 Cebula szalotka uprawiana z siewu*	bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)	2,5-4,0 l/ha
	po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści	2,5-3,5 l/ha
 Czosnek*	bezpośrednio po sadzeniu ząbków, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)	2,5-4,0 l/ha
	po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12)	2,5-3,5 l/ha
 Brokuł*	od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady	3,0-4,0 l/ha
 Sorgo zwiste, proso zwyczajne*	doglebowo, do 3 dni po siewie, ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05)	3,5-4,0 l/ha
	po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)	
 Słonecznik zwyczajny*	wiosną po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09)	4,0 l/ha
 Plantacje nasienne traw*	jesienią, po wschodach traw od fazy szpilowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13)	4,0 l/ha

*Uprawy małoobszarowe – odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pobierz aplikację
Agro Porada



® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66

Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska