

Merpan® 80 WDG

Podstawa ochrony fungicydowej!



ADAMA

Wysoka skuteczność
na parcha w infekcjach
pierwotnych i wtórnych.

Główną chorobą występującą w sadzie jest parch jabłoni, który może zniszczyć 2/3 plonu owoców. Skuteczne zwalczanie parcha jabłoni jest najważniejszym elementem, który decyduje o powodzeniu w produkcji jabłek. Istotną rolę w walce z tą chorobą odgrywa chemiczna metoda ochrony. O jej efektywności decyduje wybór właściwego fungicydu.



parch jabłoni



parch gruszy

Merpan 80 WDG



- ▶ podstawa fungicydowej ochrony jabłoni, gruszy i wiśni,
- ▶ powszechnie stosowany środek zapobiegawczy działający kontaktowo,
- ▶ wysoka skuteczność na parcha w infekcjach pierwotnych i wtórnych,
- ▶ rejestracja w truskawce przeciwko szarej pleśni,
- ▶ brak uodpornień patogenów na substancję.

Merpan 80 WDG – sprawdzona substancja czynna – kaptan

- ▶ podstawowy fungicyd powierzchniowy,
- ▶ wielostronne działanie na komórki grzyba,
- ▶ wysoka skuteczność zwalczania parcha,
- ▶ wieloletnie stosowanie bez wykształczonej odporności.


Merpan 80 WDG – działanie zapobiegawcze

Wielostronne działanie na komórki grzyba



Merpan 80 WDG – skuteczność na parcha potwierdzona wieloletnią praktyką

Merpan 80 WDG 1,9 kg/ha – skuteczność grzybobójcza (%)



Wyniki doświadczeń polowych przeprowadzonych w Polsce w latach 2006-2008.

Merpan 80 WDG – podstawa fungicydowej ochrony w sadach

Zastosowanie w jabłoni i gruszy

- ▶ skutecznie chroni jabłonie i grusze przed parchem,
- ▶ stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą,
- ▶ maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7,
- ▶ odstęp między zabiegami: 10 dni.

Merpan 80 WDG 1,9 kg/ha



Zastosowanie w wiśniach

- ▶ w ochronie wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni i drobną plamistością liści drzew pestkowych,
- ▶ środek stosować od końca fazy kwitnienia,
- ▶ maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3,
- ▶ odstęp między zabiegami: 10 dni.

Zastosowanie w truskawkach

- ▶ skuteczny w ochronie przed szarą pleśnią,
- ▶ środek stosować od fazy, gdy kwiatostany pogrubiają się, a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą, aż do pełni fazy kwitnienia,
- ▶ maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2,
- ▶ minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Merpan 80 WDG 1,9 kg/ha



65

pełnia
kwitnienia



69

koniec
kwitnienia



70-81

rozwój
owoców

Merpan 80 WDG 1,9 kg/ha



55

rozwój
kwiatostanu



61

kwitnienie,
opadanie płatków



85

dojrzwanie
owoców



gorzka zgnilizna wiśni



drobna plamistość liści
drzew pestkowych



szara pleśń

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz
aplikację
Agro Porada



Dołącz
do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz
na www.adama.com/polska