

NOWOŚĆ!



ADAMA

INSEKTYCYD



Jasne, że działa!

Cosayr[®] 200 SC



Podstawa w skutecznej
ochronie ziemniaka
przed stonką ziemniaczaną.

Cosayr

- ▶ pewność działania,
- ▶ skuteczność min. do 2 tygodni po zabiegu,
- ▶ większa niezależność od temperatur (skuteczny w wyższych temperaturach niż pyretroidy),
- ▶ brak odporności (w porównaniu z acetamiprydem i pyretroidami).

optymalny termin zabiegu



Jaja – za wcześnie



Młode larwy (L1/L2) barwy wiśniowej/czerwonej



Larwy starsze (L3/L4) barwy pomarańczowej



Chrzęszcze


Stonka ziemniaczana (chrzęszcze i larwy)

- ▶ Maksymalna/zalecana dawka: 60 ml/ha.
- ▶ Liczba zabiegów w sezonie: 1.
- ▶ Termin: BBCH 31-60, po wystąpieniu szkodnika, od początku zakrywania międzyrzędzi do pierwszych kwiatostanów na pędzie głównym.
- ▶ Karencja: 14 dni.

W większości zabiegów wykonuje się w celu zniszczenia larw, jednak szczególnie na plantacjach ziemniaków wczesnych konieczne może okazać się zwalczanie chrzęszczy.

Dla zachowania wysokiej skuteczności zadbaj o optymalne pH cieczy roboczej 4,5-5,5 (poniżej 6!).

% skuteczności 10-12 dni po zabiegu



Kontrola



Cosayr



® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Dołącz do nas



Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska