

NOWOŚĆ!



ADAMA

INSEKTYCYD



Uniwersalne rozwiązanie w Twoich rękach!

Leaxo[®] 200 SL

- Uniwersalny insektycyd systemiczny,
- oparty na acetamiprydzie,
- zapewniający pewne rozwiązanie
- w ochronie rzepaku, zbóż, buraka
- i ziemniaka.

Słuchamy · Rozumiemy · Spełniamy oczekiwania

ADAMA.COM/Polka


Leaxo 200 SL

- ▶ działanie powierzchniowe, wgłębne i systemiczne na roślinie,
- ▶ uniwersalność zastosowania,
- ▶ możliwość jesiennego zastosowania przeciwko mszycom w zbożach oraz pchełkom w rzepaku,
- ▶ skuteczność w szerokim zakresie temperatur (od 50°C do 250°C),
- ▶ bezpieczeństwo dla operatora i łatwość zastosowania dzięki płynnej formulacji.

Leaxo 200 SL - zastosowania

| Uprawa | Agrofag | Dawka /ha | Termin stosowania | Liczba zabiegów /sezon |
|--------------|--|-----------|---|--|
| Rzepak ozimy | Pchełka rzepakowa | 0,24 | od fazy 1 liścia, do fazy 9 lub więcej liści | 1 (1 zabieg jesienią lub 1 zabieg wiosną) |
| | Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny | 0,3 | od pierwszego międzywęźla do fazy „żółtego pąka” | |
| | Słodyszek rzepakowy | 0,3 | od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy „żółtego pąka” | |
| | Pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik | 0,3 | od początku fazy kwitnienia do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość | |

Możliwość łącznego stosowania z Mavrik VITA przeciwko szkodnikom łuszczynowym w rzepaku



Źródło: średnia z 2 doświadczeń z Polski, 2025.

| Uprawa | Agrofag | Dawka / ha | Termin stosowania | Liczba zabiegów / sezon |
|------------------|---|------------|---|--|
| Jęczmień ozimy | Mszyce (wektory wirusów) | 0,15 | od fazy 2 liścia do końca fazy krzewienia | 1 |
| Pszemica ozima | Mszyce (wektory wirusów) | 0,15 | od fazy 2 liścia do końca fazy krzewienia | 2 (1 zabieg jesienią, 1 zabieg wiosną) |
| | Mszyce wiosenne | 0,18 | od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia | |
| Pszemczyto ozime | Mszyce wiosenne | 0,18 | od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia | 1 |
| Burak cukrowy | Mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca burakowa | 0,25 | od 2 liści do fazy do całkowitego zakrycia międzyrzędzi | 1 |
| Ziemniak | Stonka ziemniaczana, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca ziemniaczana | 0,18 | Od fazy 2 liścia do końca rozwoju owoców | 1 |

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Dołącz do nas



Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska