

SULCOTREK®

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)
sulcotriona 173 g/L ou 15,04% (p/p)
terbutilazina 327 g/L ou 28,43% (p/p)

Cultura: Milho.

Autorização de venda nº 1106 concedida pela DGAV.
Titular da Autorização de Venda:

ADAMA Portugal, Lda.

Avenida Defensores de Chaves 15-5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Data de produção e Lote nº (ver impresso)



5 Litros



**HERBICIDA
sistémico**

ADAMA

SULCOTREK®



HERBICIDA
sistémico

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Lote n° e Data de produção (ver impresso)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H302 - Nocivo por ingestão.

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H361d Suspeito de afetar o nascituro.

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.

P260 - Não respirar a nuvem de pulverização.

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

sulcotriona 173 g/L ou 15,04% (p/p)

terbutilazina 327 g/L ou 28,43% (p/p)

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P281 - Usar o equipamento de proteção individual exigido.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.



ATENÇÃO

Autorização de Venda n° 1106 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA Portugal, Lda.

Av. Defensores de Chaves n°15 - 5°B

1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

5 Litros



valorfito



5 600891 161368

SULCOTREK®



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

sulcotriona 173 g/L ou 15,04% (p/p)
terbutilazina 327 g/L ou 28,43% (p/p)

Nota

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de Venda nº 1106 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA PORTUGAL, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa
Telf.: 217 166 861

Sulcotrek é uma marca registada
por uma empresa do grupo
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

SULCOTREK®



HERBICIDA
sistémico

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Lote nº e Data de produção (ver impresso)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- H302 - Nocivo por ingestão.
- H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- H361d Suspeito de afetar o nascituro.
- H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
- H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
- P260 - Não respirar a nuvem de pulverização.

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

sulcotriona 173 g/L ou 15,04% (p/p)
terbutilazina 327 g/L ou 28,43% (p/p)

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P281 - Usar o equipamento de proteção individual exigido.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Mantem em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

Autorização de Venda nº 1106 concedida pela DGAV
Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

5 Litros

ATENÇÃO

5 600891 161368

SULCOTREK®



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

sulcotriona 173 g/L ou 15,04% (p/p)

terbutilazina 327 g/L ou 28,43% (p/p)

SULCOTREK® é um herbicida sistêmico de absorção radicular e foliar destinado ao controlo de infestantes dicotiledóneas anuais e algumas gramíneas.

SULCOTREK combina duas substâncias ativas, a sulcotriona pertencente ao grupo químico ciclohexanodiona que atua através da inibição da enzima hidrogenase piruvato diosigenase (4-HPPD inibidor), a qual interfere no sistema de pigmentos carotenóides a nível da planta e a terbutilazina cujo grupo químico é 1,3,5-triazina e que actua inibindo o transporte de electrões ao nível da fotossistema II.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com HRAC:

GRUPO	27	5	HERBICIDA
-------	----	---	-----------

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

MILHO: 2 a 2,6 L/ha – Aplicar em pré e pós-emergência da cultura, até ao estado fenológico de 6 folhas (BBCH 00-16). Em pós-semergência aplicar aos primeiros estados de desenvolvimento das infestantes (até às 4 folhas). **Aplicar o SULCOTREK apenas de três em três anos na mesma parcela.**

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS: Beldroega (*Portulaca olerácea*); bredo-branco (*Amaranthus albus*); bolsa-do-pastor (*Capsella bursa-pastoris*); catassol (*Chenopodium album*); corriola (*Convolvulus arvensis*); corriola-bastarda (*Fallopia convolvulus*); erva-moira (*Solanum nigrum*); erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*); figueira-do-inferno (*Datura stramonium*); cavalinha-dos campos (*Equisetum arvense*); lâmio-roxo (*Lamium purpureum*); moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*); malvão (*Abutilon theophrasti*); milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*); milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); milhã-do-arroz (*Echinochloa orizoides*); picão-bravo (*Galinsoga parviflora*), raspa-saias (*Picris* sp); serralha-macia (*Sonchus oleraceus*); tasneirinha (*Senecio vulgaris*); urtiga (*Mercurialis ambigua*); urtiga-menor (*Urtica urens*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS: Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*); barrilha-espinosa (*Salsola kali*).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade de distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda recomendada: 200 a 400 L por hectare.