

CLASSIFICAÇÃO RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

O **ORISOS 200 EW** é um fungicida sistémico com atividade preventiva e curativa, constituído pela substância ativa penconazol, que pertence ao grupo químico dos triazóis. O penconazol inibe a biossíntese dos esteróis na detumescência (DMI).

Classificação do modo de acção das substâncias activas de acordo com FRAC: **GRUPO 3 FUNGICIDA**

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• **Videira: Oídio (*Uncinula necator*)**, 15 mL/L ou 0,15 L/ha. Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência iniciar as aplicações a partir do estado de cachos visíveis. A persistência biológica do produto é de 12-14 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, alta pressão da doença). **Realizar no máximo 3 tratamentos, posicionados até ao fecho dos cachos, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI.**

• **Pessegueiro, Nectarina e Damasqueiro: Oídio (*Sphaerotheca pannosa*)**, 25 mL/hL (máximo de 375 mL/ha). Iniciar os tratamentos após a floração, protegendo a cultura a partir do aparecimento dos primeiros sintomas até à colheita, quando as condições climáticas forem favoráveis à doença. A persistência biológica do produto é de 12-14 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, alta pressão da doença). **Realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI.**

• **Macieira e Marmeleiro: Oídio (*Podosphaera leucotricha*)**, 25 mL/hL (máximo de 250 mL/ha). Iniciar as aplicações desde o abrolhamento dos gomos até ao fim do crescimento dos rebentos. A persistência biológica do produto é de 12-14 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, alta pressão da doença). **Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto. Por ano e no conjunto das doenças, realizar no máximo 4 aplicações com fungicidas do grupo dos DMI.**

• **Morangueiro (ar livre e estufa): Oídio (*Podosphaera aphanis*)**, 0,25 L/ha. Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas, prosseguir os tratamentos enquanto as condições climáticas forem favoráveis à doença. A persistência biológica do produto é de 10-14 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, alta pressão da doença). **Realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI.**

• **Abóbora, Pepino, Meloeiro, Melancia, Courgete (ar livre e estufa): Oídio (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*)**, 17,5 - 25 mL/hL (dose máxima de 250 mL/ha). Iniciar as aplicações quando as plantas apresentarem 3 a 5 folhas definitivas e prosseguir os tratamentos se as condições climáticas forem favoráveis à doença. Aplicar a concentração mais alta, em condições de maior pressão da doença. A persistência biológica do produto é de 10-14 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, alta pressão da doença). **Realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI.**

• **Pimenteiro e Tomateiro (ar livre e estufa): Oídio (*Leveillula taurica*)**, 17,5 - 25 mL/hL (máximo de 250 mL/ha). Iniciar as aplicações quando as plantas apresentarem 3 a 5 folhas definitivas e prosseguir os tratamentos se as condições climáticas forem favoráveis à doença. Aplicar a concentração mais alta, em condições de maior pressão da doença. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, alta pressão da doença). **Realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI.**

• **Alcachofra (ar livre): Oídio (*Leveillula taurica*)**, 0,25 L/ha. Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas, prosseguir os tratamentos enquanto as condições climáticas forem favoráveis à doença. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, alta pressão da doença). **Realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI.**

INTERVALO DE SEGURANÇA: Abóbora, Courgete, Melancia, Meloeiro, Morangueiro, Pepino, Pimenteiro e Tomateiro: 3 dias. Alcachofra, Damasqueiro, Macieira, Marmeleiro, Nectarina, Pessegueiro e Videira: 14 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Tomateiro: consultar a indústria transformadora antes de usar o produto em culturas cuja produção, se destina a processamento industrial. Não se deve aplicar este produto em locais onde se verifiquem quebras de eficácia, após a aplicação repetida do mesmo. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo, com este ou outro fungicida do grupo dos DMI: 4 tratamentos em macieira e marmeleiro; 3 tratamentos em vinha; 2 tratamentos em pessegueiro, nectarina, damasqueiro; meloeiro, melancia, pepino, abóbora e abobrinha (ar livre e estufa); morangueiro (ar livre e estufa), pimenteiro, tomateiro (ar livre e estufa).

MODOS DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODOS DE APLICAÇÃO

Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas: Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas: Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volumes de calda: Videira: 400 a 1000 L/ha; Pessegueiro, Nectarina, Damasqueiro: 800 a 1500 L/ha; Macieira, Marmeleiro: 500 a 1500 L/ha; Morangueiro, Abóbora, Pepino, Meloeiro, Melancia, Courgete, Pimenteiro e Alcachofra: 500 a 1000 L/ha; Tomateiro: 300 a 1000 L/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. H361d Suspeito de afetar o nascituro. H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P102 Manter fora do alcance das crianças. P201 Pedir instruções específicas antes da utilização. P261 Evitar respirar as névoas e nuvem de pulverização. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. SPI Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. SPe3PT1 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. SPo2 Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção. SPoT5 Impedir o acesso das pessoas à área tratada, até secagem do pulverizador, ou usar luvas e vestuário de proteção adequado. SPgPT1 Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

ORISOS® 200 EW

EMULSÃO ÓLEO EM ÁGUA (EW)
penconazol 200 g/L ou 19,5% (p/p)
Contém: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e nafta petróleo (petróleo) aromática pesada

Fungicida sistémico, com atividade preventiva e curativa indicado para combater os oídios

Culturas

Videira, macieira, tomateiro...
(para outras culturas ver Utilizações).

Autorização de venda nº 1856 concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:

Syngenta Crop Protection, Ldº

Avenida D. João II

Edif. Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso

1990-079 Lisboa - Tel. 21 794 32 00

www.syngenta.pt

Distribuído por: **ADAMA Portugal Lda.**

Avenida D. João II

Edif. Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso

1990-079 Lisboa -Tel.: +351 924 036 454



FUNGICIDA

ADAMA

Mod:220426

500 mL

UFI: X65Y-4Q19-U200-G02U

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFSSIONAL.

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANter FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Data de produção e Lote nº (ver embalagem)



© Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA

L30928|PWR_01



ATENÇÃO

ORISOS[®] 200 EW

EMULSÃO ÓLEO EM ÁGUA (EW)

COMPOSIÇÃO

penconazol 200 g/L ou 19,5% (p/p)

Contém: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e nafta petróleo (petróleo) aromática pesada

Autorização de venda nº 1856 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

Syngenta Crop Protection, Lda.

Av. D. João II Ed. Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 Lisboa - Tel.: 21 794 32 00

Distribuído por: **ADAMA Portugal Lda.**

Av. D. João II Ed. Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 Lisboa - Tel.: +351 924 036 454

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea • H319 Provoca irritação ocular grave • H361d Suspeito de afetar o nascituro • H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros • P102 Manter fora do alcance das crianças • P201 Pedir instruções específicas antes da utilização • P261 Evitar respirar as névoas e nuvem de pulverização • P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto • P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial • P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar • P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico • P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico • P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico • P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos • EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido • EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização • SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas • SPe3PT1 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície • SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares • SPo2 Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção • SPoPT5 Impedir o acesso das pessoas à área tratada, até secagem do pulverizado, ou usar luvas e vestuário de proteção adequado • SPgPT1 Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.



FUNGICIDA

ADAMA

24x500 mL



ATENÇÃO



ORISOS[®] 200 EW