

MERPAN[®] 480 SC

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

captana 480 g/L ou 39% (p/p)

FUNGICIDA

Culturas

Macieira, pereira, pessegueiro...
(para outras culturas ver interior do rótulo).

Autorização de venda n° 0702 concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA PORTUGAL, Lda.

Av. Defensores de Chaves n°15 - 5°B
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Data de produção e Lote n° (ver impresso)



5 Litros



FUNGICIDA

ADAMA
ESSENTIALS

MERPAN® 480 SC



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

captana 480 g/L ou 39% (p/p)

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Data de produção e Lote nº (ver impresso)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea •
H351 - Suspeito de provocar cancro • H400 - Muito tóxico
para os organismos aquáticos • P202 - Não manuseie o
produto antes de ter lido e percebido todas as precauções
de segurança • P261 - Evitar respirar a nuvem de pulveri-
zação • P270 - Não comer, beber ou fumar durante a
utilização deste produto • P280 - Usar luvas de protecção,
vestuário de protecção e protecção facial • P308+P313 - EM
CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte
um médico • P333+P313 - Em caso de irritação ou
erupção cutânea: consulte um médico • P391 - Recolher o
produto derramado • P405 - Armazenar em local fechado
à chave • P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em

local adequado à recolha de resíduos perigosos •
EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido •
SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a
sua embalagem • SPe3PT3 - Para protecção dos
organismos aquáticos, respeitar uma zona não
pulverizada com cobertura vegetal em relação às
águas de superfície de 20 metros em macieira e
pereira e de 30 metros em cerejeira, pessegueiro,
ameixeira e damasqueiro • SPoPT2 - Na entrada
dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão
usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças,
meias e botas • SPoPT4 - O aplicador deverá usar:
luvas de protecção, vestuário de protecção e
protecção facial durante a preparação da calda e
aplicação do produto • SPoPT5 - Impedir o acesso
de trabalhadores e pessoas estranhas ao
tratamento às zonas tratadas até à secagem do
pulverizado • SPoPT6 - Após o tratamento lavar
bem o material de protecção, tendo cuidado
especial em lavar as luvas por dentro.

**Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de
Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250**

5 Litros



ATENÇÃO

Autorização de Venda nº 0702
concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA PORTUGAL, Lda.

Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

UFI: YTJU-1FC2-EQ06-QSAG



MERPAN® 480 SC



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO
captana 480 g/L ou 39% (p/p)



valorfito

Nota
Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de Venda n° 0702 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA PORTUGAL, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa
Telf.: 217 166 861

Merpan é uma marca registada
por uma empresa do grupo
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

MERPAN® 480 SC



FUNGICIDA

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO
captana 480 g/L ou 39% (p/p)

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Data de produção e Lote n° (ver impresso)

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS,
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea • H351 - Suspeito de provocar cancro • H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos • P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança • P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização • P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto • P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção facial • P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico • P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico • P391 - Recolher o produto derramado • P405 - Armazenar em local fechado à chave • P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em

local adequado à recolha de resíduos perigosos • EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido • SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem • SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada com cobertura vegetal em relação às águas de superfície de 20 metros em macieira e pereira e de 30 metros em cerejeira, pessegueiro, ameixeira e damasqueiro • SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas • SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto • SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado • SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250

5 Litros



ATENÇÃO



valorfito

Autorização de Venda n° 0702
concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA PORTUGAL, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

UFI: YTUJ-1FC2-EQ06-QSAG



5 600891 162181

MERPAN® 480 SC



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

captana 480 g/L ou 39% (p/p)

Classificação do modo de acção das substâncias activas de acordo com FRAC:

GRUPO M4 FUNGICIDA

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

- Não utilizar em pereiras das cultivares "Anjou" e "Bosc".
- Não utilizar em macieiras das cultivares do grupo "Delicious" nem da cultivar "Wine sap" ou outras susceptíveis.
- Não usar em pereira, macieira, cerejeira, pessegueiro, ameixeira e damasqueiro quando a fruta se destina a conservas ou transformação industrial.

INCOMPATIBILIDADE: O MERPAN 480 SC não deve ser misturado com produtos alcalinos, nem com emulsões oleosas.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda a utilizar: 700 a 1000 L/ha.

O MERPAN 480 SC é um fungicida orgânico de largo espectro de acção, pertencente ao grupo das ftalimidas. É um fungicida de superfície com atividade preventiva (inibe a germinação dos esporos), que atua em diversos processos metabólicos dos fungos (multi-site). Indicado para o controlo das doenças nas culturas a seguir indicadas:

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Sempre que existam disponíveis, seguir as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas.

CULTURAS	DOENÇA	CONCENTRAÇÃO	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	I.S. (dias)
Ameixeira	Moniliose (<i>Monilinia fructigena</i> , <i>M. laxa</i>)	250 mL/hL	Utilizar este produto preventivamente em tratamentos durante a floração.	21
Cerejeira			A persistência biológica do produto é de 10-12 dias.	14
Macieira, Pereira			Não devem ser realizados mais de 2 tratamentos em cerejeira e 4 tratamentos em ameixeira.	28
Ameixeira, Damasqueiro, Pessegueiro	Crivado (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	300 mL/hL	Iniciar os tratamentos à queda das pétalas e durante o crescimento do fruto, se as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento da doença. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias.	21
Cerejeira			Não devem ser realizados mais de 2 tratamentos em cerejeira e 4 tratamentos em ameixeira, pessegueiro e damasqueiro.	14

I.S. - Intervalo de segurança