



FOLPAN[®] 80 WDG



ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA



FUNGICIDA

GRANULADO DISPERSABLE
EN AGUA (WG)

Fungicida de amplio espectro con actividad preventiva.



COMPOSICIÓN

- Folpet 800 g/kg (80% p/p)



Cultivos

Vid (vid de mesa y de vinificación), tomate...
(para otros cultivos ver Aplicaciones autorizadas).



Información

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

USO PROFESIONAL EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN GENERAL.

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n° 19.994

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano N° 29 - 2ª
28043 Madrid - Tel.: 91 585 23 80



Escanear para más información



FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE:
Ver marcado impreso

L30207IPFR_01

5 kg



ATENCIÓN

H315 - Provoca irritación cutánea • H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel • H319 - Provoca irritación ocular grave • H332 - Nocivo en caso de inhalación • H351 - Se sospecha que provoca cáncer • H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos • P201+P202 - Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad • P261 - Evitar respirar la niebla de pulverización • P273 - Evitar su liberación al medio ambiente • P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección • P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón • P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración • P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando • P391 - Recoger el vertido • P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

UFI: 4032-GHSQ-XU0R-EKHC

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase • **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal • En contactos repetidos dermatitis alérgica y sensibilización pulmonar.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE LA MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel.: (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS, MODO DE EMPLEO y PLAZO DE SEGURIDAD

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Condicionamientos	P.S.*
Vid de Mesa	Black rot, podredumbre negra de la vid, (<i>Phyllosticta ampellicida</i>),	250 g/hl	Aplicar mediante pulverización normal con tractor. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en prefloración (antes de BBCH 60), con un intervalo de 7 a 10 días entre las mismas, con un máximo de 2 kg/ha y tratamiento y un máximo de 3,2 kg/ha por campaña.	NP
Vid de Vinificación	<i>Botrytis</i> spp., cicatrización de heridas de granizo; mildiu de la vid (<i>Plasmopara viticola</i>)		Aplicar mediante pulverización normal con tractor. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7 a 10 días entre las mismas con un máximo de 1,8 kg/ha y tratamiento y 3,2 kg/ha por campaña.	28
Tomate	Fusariosis (<i>Fusarium</i> spp.), alternaria de las solanáceas (<i>Alternaria solani</i>), antracnosis del tomate (<i>Colletotrichum coccodes</i>), <i>Botrytis</i> spp., mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/hl	Aplicar mediante pulverización normal con tractor al aire libre o manual en invernadero. Para fusariosis aplicar al cuello de la planta. Realizar una única aplicación con un máximo de 1,55 kg/ha en aire libre y 2 kg/ha en invernadero. En aire libre, aplicar desde la formación del fruto y en invernadero no aplicar cuando el cultivo tenga más de un metro de altura.	10
Patata	Fusariosis (<i>Fusarium</i> spp.), alternaria de las solanáceas (<i>Alternaria solani</i>), antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/hl	Aplicar mediante pulverización normal con tractor (para fusariosis aplicar al cuello de la planta). Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7 a 10 días entre las mismas con un máximo de 1,55 kg/ha y tratamiento y 2,5 kg/ha por campaña.	14
Rosales	Antracnosis del rosál (<i>Elsinoë rosarum</i>)	200 g/hl	Aplicar mediante pulverización normal con tractor al aire libre o manual en invernadero. Realizar una única aplicación con un máximo de 2 kg/ha. En invernadero no aplicar cuando el cultivo tenga más de un metro de altura.	NP
Ornamentales herbáceas, palmáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales. Coníferas y frondosas (ambas exclusivamente para uso ornamental)	Mildius de la familia <i>Peronosporaceae</i> , fialofora (<i>Phialophora</i> spp.), fusariosis (<i>Fusarium</i> spp.), <i>Alternaria</i> spp., <i>Botrytis</i> spp., Cladosporiosis (<i>Cladosporium</i> spp.)	200 g/hl	Aplicar mediante pulverización normal con tractor al aire libre o manual en invernadero. Para fialofora o fusariosis aplicar al cuello de la planta. Realizar una única aplicación con un máximo de 2 kg/ha. En invernadero no aplicar cuando el cultivo tenga más de un metro de altura.	NP

* Plazo de Seguridad (días)

OBSERVACIONES

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general (plantas ornamentales y leñosas, chopo, álamo y rosál), en cumplimiento con el artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

GESTIÓN DE ENVASES

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).



NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

SPe 3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de:

- 40 m con 20 m de cubierta vegetal en ornamentales herbáceas y arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y rosales.
- 20 m con cubierta vegetal en patata.
- 20 m con cubierta vegetal o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 50% en tomate al aire libre y vid, hasta las masas de agua superficial.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Seguridad del operador: Para las operaciones de mezcla/carga se utilizarán guantes de protección química y además mascarilla FFP2SL o P2 en el caso de aplicaciones al aire libre.

Para las operaciones de aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se utilizarán guantes de protección química, ropa de protección química tipo 3 o 4 (norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009) y mascarilla FFP2 en invernadero. En el caso de aire libre se utilizarán guantes de protección química, ropa de protección química (norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009), calzado adecuado y en palmáceas, coníferas, frondosas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, rosales y vid se utilizará adicionalmente mascarilla FFP2SL o P2.

Seguridad del trabajador: El trabajador deberá utilizar guantes de protección química para todas las tareas, en los usos de tomate al aire libre y vid y únicamente para tareas de más de 2h de duración en el resto de usos, excepto en patata • Plazo de reentrada para tareas de más de 2h: 4 días en tomate al aire libre, 3 días en ornamentales y rosál al aire libre y 14 días en vid, ornamentales y rosál en invernadero • Plazo de reentrada para tareas de menos de 2h: 2 días en vid • Durante la aplicación con tractor en cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas • Evítense el contacto con follaje húmedo durante el tratamiento • En el caso de vid no es necesario el uso de guantes de protección química para el trabajador en tareas de duración superior a 2 horas si se respeta un periodo de reentrada de 5 días • No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen actividades mecánicas que puedan derivar a un deterioro de los guantes de protección química en el trabajador durante la reentrada de este a la finca • Lávese toda la ropa de protección después de usarla • Ventilar bien las zonas/los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO M04 FUNGICIDA

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

