

**ECLIPSE® WG**



**GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA**

**COMPOSIÇÃO**  
metribuzina 700 g/kg ou 70% (p/p)

**MODO DE APLICAÇÃO**

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

**Volume de calda: 200-500L/ha;** No caso do tomateiro no viveiro, quando se aplica o produto apenas nos regos, deve utilizar-se um volume de calda de 150 a 200 L/ha.

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H410 - Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P281 - Usar equipamento de proteção individual exigido.

P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva. No caso

de utilização de bicos que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda durante a aplicação do produto, pode-se reduzir a largura das zonas não pulverizadas com coberto vegetal para 10 metros em batateira e tomateiro e para 5 metros em cenoura e soja.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de: 20 metros com coberto vegetal em culturas de batateira e de tomateiro e de 10 metros com coberto vegetal em culturas de cenoura e de soja.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

**Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef. 800 250 250.**



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

**NOTA**

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Herbicida residual sistémico predominantemente absorvido pelas raízes. Pertence à família química triazinona, inibindo a fotossíntese e manifestando-se o seu efeito nas infestantes pelo aparecimento de cloroses, dessecação das pontas, murchidão e morte. Atua sobre infestantes dicotiledóneas e algumas gramíneas das culturas da Batateira, Tomateiro, Cenoura e Soja.

**Classificação do modo de acção das substâncias activas de acordo com HRAC:**

**GRUPO C1 HERBICIDA**

**UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

CULTURAS	DOSES kg/ha	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	I.S. dias
Batateira	0,75	Aplicar em pré ou pós emergência precoce (BBCH 10). O terreno deverá estar bem preparado e húmido e, com as infestantes já nascidas (2 folhas) e as batateiras/brolhos a romperem o solo.	N.A.
Cenoura	0,25-0,35	Aplicar em pós emergência da cultura, a partir de 2-3 folhas, (BBCH 14) e após a emergência das infestantes até à fase de 2 folhas. As doses mais elevadas devem ser aplicadas em solos mais pesados e ricos em matéria orgânica ou na presença de infestantes mais desenvolvidos ou de difícil controlo.	60
Tomateiro	0,75	Aplicar em pós-transplantação, após a crise de transplantação. A calda deve ser aplicada nos regos com a terra molhada ou muito húmida, com as infestantes nascidas (até 2 folhas). Também se pode aplicar o produto nos regos sem humidade, desde que se faça uma rega uma hora depois da aplicação.	N.A.
Soja	0,25-0,35	Aplicar em pré-emergência da cultura, regar após a aplicação.	N.A.
Viveiros de tomateiro	instalados até finais de Janeiro 0,375 instalados depois de Janeiro 0,3	Aplicação do produto nos regos, em pós sementeira, em terreno bem nivelado, preparado e húmido. Após a aplicação efetuar uma rega.	N.A.

I.S. Intervalo de segurança; N.A. não aplicável

**ECLIPSE® WG**

**GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA (WG)**  
metribuzina 700 g/kg ou 70% (p/p)

Herbicida residual sistémico no controlo de infestantes dicotiledóneas e algumas gramíneas.

**Culturas**

Batateira, tomateiro, cenoura, soja.  
(para outras culturas ver interior do rótulo).

Autorização de venda nº 0456 concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:

**ADAMA Portugal, Lda.**

Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB

1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL. PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Data de produção e Lote nº (ver impresso)**



**500 g**



**HERBICIDA**

**ADAMA**  
ESSENTIALS

133025 R08 - PT

**INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS:** Bredo-branco (*Amaranthus albus*), moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), catassol (*Chenopodium album*), cabelo-de-cão (*Poa annua*), poa-comum (*Poa trivialis*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), beldroega (*Portulaca oleracea*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), mal-casada (*Polygonum lapathifolium*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*).

**INFESTANTES RESISTENTES:** Juta-da-china (*Abutilon theophrasti*), Junça-de conta (*Cyperus rotundus*), erva-moira (*Solanum nigrum*) e corriola (*Convolvulus arvensis*).

**PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS**

Algumas variedades de batateira e tomateiro podem apresentar alguma sensibilidade ao ECLIPSE® WG, em caso de dúvidas contactar os nossos Serviços Técnicos • Não se deve aplicar o produto em tomates com plantas doentes • Tanto na cultura da batata como do tomate, não é aconselhável aplicar ECLIPSE® WG em terrenos de areia solta • Não se deve plantar ou semear outras culturas além das referidas no rótulo, durante 5 meses após a aplicação do ECLIPSE® WG • Não mobilizar o solo após a aplicação • Não atingir terrenos e culturas vizinhas da área a tratar • Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha substâncias ativas das famílias químicas triazina, triazinona e ureia, sempre que possível, e à alternância com outros herbicidas de diferente modo de ação.

**MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA**

De forma a evitar espuma não utilize agitação na parte superior do tanque. Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

Autorização de venda nº 0456 concedida pela DGAV  
Titular da Autorização de Venda:  
**ADAMA Portugal, Lda.**  
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB  
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

**ATENÇÃO**

Eclipse é uma marca registada por uma empresa do grupo ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

5 600891 160385

220 mm

368 mm

528 mm