

NINJA® WITH ZEON TECHNOLOGY



ADAMA

® Marca registada da Syngenta Group Company



INSETICIDA

SUSPENSÃO DE
CÁPSULAS (CS)

Inseticida com ação de contacto e ingestão



Composição

- Lambda-cialotrina 100 g/L ou 9,5% (p/p)
Contém: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona



Culturas

Oliveira, Tomateiro, Macieira, Pereira... (para outras culturas ver interior do rótulo)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Autorização de venda N°: 0090 concedida pela DGAV.

Titular:

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldaº Av. D. João II - Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º
 piso 1990-079 Lisboa. Tel. 21 794 32 00

Distribuído por:

ADAMA Portugal, Lda. Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso - 1990-079 Lisboa. Tel.: +351 924 036 454

Os nomes dos produtos assinalados com ®, a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas
registadas da Syngenta Group Company.

Lote e Data de produção: ver embalagem

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes
serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavaagem deverão ser usadas na preparação da calda.



Digitalizar para mais informação



NO VARNISH
AREA

5 Litros

Product name	NINJA® with Zeon Technology			
Country	PT			
Package size	5 Litros			
Label code	L30160IPFR_03			
Label dimensions (w × h)	170mm × 150mm	Name		
Label date	04.12.25	Status		
Smallest font on page	6,27 nt	Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt	

L30160IPFR_03

NINJA® WITH ZEON TECHNOLOGY



INSETICIDA

SUSPENSÃO DE CÁPSULAS (CS)

GRUPO 3A INSETICIDA

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- H332 - Nocivo por ingestão.
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H332 - Nocivo por inalação.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 - Usar luvas de proteção.
P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P391 - Recolher o produto derramado.
P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros, em relação às zonas não cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em videira e marangueiro.

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros, em relação às águas de superfície, incluindo cobertura vegetal e utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em macieira, pereira, pessegueiro (incluindo nectarina), ameixeira, damasqueiro, citrinos, oliveira e videira (aplicação tardia).

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros, em relação às águas de superfície, incluindo cobertura vegetal, e utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em couves, tomateiro, batateiro, marangueiro, cereais, milho e vinha (aplicação precoce).

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pul-

verizada de 10 metros, em relação às zonas não cultivadas e utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em macieira, pereira, pessegueiro (incluindo nectarina), ameixeira, damasqueiro, citrinos e oliveira.

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros, em relação às zonas não cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 30% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em couves, tomateiro, batateira, cereais e milho.

Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Aerjar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas voltar a entrar.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

O aplicador deverá usar luvas adequadas, vestuário de proteção adequado durante a preparação da calda, aplicação do produto, atividades de manutenção, quando em contacto com superfícies contaminadas e limpeza do material de aplicação. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto. Não são permitidas aplicações com pulverizadores manuais.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Intervalo de reentrada - 9 dias após a aplicação em videira; 2 dias após a aplicação em pomóideas, prunóideas, oliveira e citrinos.

Para proteção de pessoas estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecida uma zona de não cultivo de 5 metros entre as culturas e estradas, habitações, edifícios públicos, jardins públicos e espaços públicos. A aplicação deverá ser efetuada com bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento de calda pulverizada durante a aplicação do produto.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

L30160IPBB_03



ATENÇÃO

UN 3082

UFI: 41WR-UD49-VV0J-M91G



5 600891 161559



Utilização do produto

Características biológicas

Recomendações de uso

Product name	NINJA® with Zeon technology		
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30160IPBB_03		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	24.12.25	Status	
Smallest font on page	5.34 pt	Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt



NINJA® WITH ZEON TECHNOLOGY



INSETICIDA

SUSPENSÃO DE CÁPSULAS (CS)



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H332 - Nocivo por ingestão.

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H332 - Nocivo por inalação.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 - Usar luvas de proteção.

P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P391 - Recolher o produto derramado.

P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros, em relação às zonas não cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em videira e morangueiro.

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros, em relação às águas de superfície, incluindo coberto vegetal e utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em macieira, pereira, pessegueiro (incluindo nectarina), ameixeira, damasqueiro, citrinos, oliveira e videira (aplicação tardia).

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros, em relação às águas de superfície, incluindo coberto vegetal, e utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em couves, tomateiro, batateira, morangueiro, cereais, milho e vinha (aplicação precoce).

GRUPO 3A INSETICIDA

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros, em relação às zonas não cultivadas e utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em macieira, pereira, pessegueiro (incluindo nectarina), ameixeira, damasqueiro, citrinos e oliveira.

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros, em relação às zonas não cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 30% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em couves, tomateiro, batateira, cereais e milho.

Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas voltar a entrar.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

O aplicador deverá usar luvas adequadas, vestuário de proteção adequado durante a preparação da calda, aplicação do produto, atividades de manutenção, quando em contacto com superfícies contaminadas e limpeza do material de aplicação. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto. Não são permitidas aplicações com pulverizadores manuais.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Intervalo de reentrada - 9 dias após a aplicação em videira; 2 dias após a aplicação em pomáceas, prunáceas, oliveira e citrinos.

Para proteção de pessoas estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecida uma zona de não cultivo de 5 metros entre as culturas e estradas, habitações, edifícios públicos, jardins públicos e espaços públicos. A aplicação deverá ser efetuada com bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento de calda pulverizada durante a aplicação do produto.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

EO_BBD109TDE1



ATENÇÃO

UN 3082

UFI: 41WR-UD49-VV0J-M91G



5 600891 161559

Product name	NINJA® with Zeon technology	
Country	PT	
Package size	5 Litros	
Label code	130160IPBB_03	
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	
Label date	04.12.25	Name
Smallest font on page	5.56 pt	Status
		Template Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt

O NINJA® with Zeon technology é um inseticida piretróide, que atua por contacto e ingestão. Atua ao nível do sistema nervoso dos insetos, como modelador dos canais de sódio.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Culturas	Praga	Condições de utilização	Conc. (mL/hL) / dose (máx. mL/ha)	Intervalo de segurança (dias)
Batateira	Nóctua (<i>Agrotis ipsilon</i>) Nóctua-cinzenta (<i>Agrotis segetum</i>)	Em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detectado o ataque, desde a emergência da cultura até à colheita (BBCH>09). Máximo 1 ou 2 tratamentos , para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural, com intervalo de 7 dias entre aplicações. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha.	75 mL/ha	7
	Escaravelho-da-batateira (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	Em presença da praga desde a emergência da cultura até à colheita (BBCH>09). Máximo 1 ou 2 tratamentos , para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha.	12,5 (máx. 125 mL/ha)	
Couve-brócolo Couve-flor Couve-de-Bruxelas	Lagarta-da-couve (<i>Pieris brassicae</i> , <i>Artogeia rapae</i>) Nóctua-da-couve (<i>Mamestra brassicae</i>)	Em presença da praga desde a emergência da cultura até à colheita (BBCH>09). Máximo 2 tratamentos para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural, com intervalo de 14 dias entre aplicações.	7,5 (máx. 75 mL/ha)	Couve-brócolo - 10 Outras - 7
	Nóctua (<i>Agrotis ipsilon</i>) Nóctua-cinzenta (<i>Agrotis segetum</i>)	Em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detectado o ataque, desde a emergência da cultura até à colheita (BBCH>09). Máximo 2 tratamentos para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural, com intervalo de 14 dias entre aplicações.	75 mL/ha	

Product name	NINJA® with Zeon technology		
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w x h)	46mm x 150mm		
Label date	24.12.25	Name	
Smallest font on page	7 pt	Status	
		Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt

Culturas	Praga	Condições de utilização	Conc. (mL/hL) / dose (máx. mL/ha)	Intervalo de segurança (dias)
Tomateiro (ar livre e estufa)	Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>) Lagarta (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)	Em presença da praga desde a emergência da cultura até à colheita (BBCH>09). Máximo 1 ou 2 tratamentos , para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	10 (máx. 100 mL/ha)	3
	Lagartas (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	Em presença da praga desde a emergência da cultura até à colheita, a partir do início da emergência da inflorescência (BBCH>49). Máximo 1 ou 2 tratamentos , para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural, com intervalo de 14 dias entre aplicações. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.		
	Nóctua (<i>Autographa gamma</i>) Nóctua-cinzenta (<i>Agrotis segetum</i>)	Em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detectado o ataque, a partir do início da emergência da inflorescência (BBCH>49). Máximo 1 ou 2 tratamentos , para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural, com intervalo de 14 dias entre aplicações. Não ultrapassando a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	75 mL/ha	
Laranjeira, Tangerineira (inclui clementina e híbridos), Limoeiro, Pessegueiro (inclui nectarina), Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro), Ameixeira	Mosca-do-Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Sempre que exista, efetue os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Máximo 1 aplicação por ciclo cultural. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	10 (máx. 100 mL/ha)	7

Culturas	Praga	Condições de utilização	Conc. (mL/hL) / dose (máx. mL/ha)	Intervalo de segurança (dias)
Macieira Pereira	Bichado-da-fruta (<i>Cydia pomonella</i>)	Sempre que exista efetue os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento em presença da praga, a partir do início do vôo do bichado (armadilha de monitorização). Máximo 1 ou 2 tratamentos por ciclo cultural, com intervalos de 14 dias entre aplicações. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	7,5 (máx. 75 mL/ha)	7
	Mosca-do-Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Sempre que exista, efetue os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Máximo 1 ou 2 tratamentos , para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	10 (máx. 100 mL/ha)	
	Afídeo-cinzentado-da-macieira (<i>Dysaphis plantaginea</i>) Afídeo-verde-da-macieira (<i>Aphis pomi</i>) Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>) Afídeo-dos-citrinos (<i>Aphis spiraecola</i>) Pulgão-lanífero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Afídeo (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>) Afídeo-verde-migrante (<i>Rhopalosiphum insertum</i>)	Aplicação direta sobre os rebentos/ramos atacados, ao início do ataque, a partir do desenvolvimento dos ramos (BBCH>19). Máximo 1 ou 2 tratamentos para o conjunto dos inimigos por ciclo cultural. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	10 (máx. 100 mL/ha)	

Culturas	Praga	Condições de utilização	Conc. (mL/hL) / dose (máx. mL/ha)	Intervalo de segurança (dias)
Oliveira	Mosca-da-azeitona (<i>Bactrocera oleae</i>)	Sempre que exista, efetue os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento a partir da lenhificação do caroço até à colheita. Máximo 1 ou 2 tratamentos , para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	10 (máx. 100 mL/ha)	7
	Traça-da-oliveira (<i>Prays oleae</i>)	Sempre que exista, efetue os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar ao aparecimento das lagartas da geração antófaga (início da floração). Os tratamentos devem ser efetuados em olivais onde sejam verificados ataques importantes e especialmente no caso da floração ser pouco abundante; os tratamentos devem ser efetuados antes da abertura das flores, mas próximo deste estado, com os botões ainda verdes ou já verde-amarelos. Máximo 1 ou 2 tratamentos por ciclo cultural, para o conjunto dos inimigos, com intervalo de 14 dias entre aplicações. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	7,5 (máx. 75 mL/ha)	
	Traça-verde (<i>Palpita vitrealis</i>)	Tratar ao aparecimento das lagartas, eclosão dos ovos. Máximo 1 ou 2 tratamentos por ciclo cultural, para o conjunto dos inimigos. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	10 (máx. 100 mL/ha)	
Milho	Nóctua (<i>Agrotis ipsilon</i>) Nóctua-cinzenta (<i>Agrotis segetum</i>)	Em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detectado o ataque. Máximo 1 aplicação para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural.	75 mL/ha	60

Culturas	Praga	Condições de utilização	Conc. (mL/hL) / dose (máx. mL/ha)	Intervalo de segurança (dias)
Morangueiro (ar livre)	Afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>)	Aplicar na presença da praga e/ou estragos. Máximo 1 aplicação para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural.	15 - 50 (máx. 100 mL/ha)	3
Morangueiro (estufa)	Afídeo-da-batateira (<i>Aulacorthum solani</i>)		10 (máx. 100 mL/ha)	
	Afídeo-do-morangueiro (<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>)			
	Afídeo-do-algodoeiro (<i>Aphis gossypii</i>) Afídeo (<i>Aphis ruborum</i>)			
Videira	Áltica-da-vinha (<i>Altica lythri</i>)	Aplicar em presença da praga, desde a ponta verde (BBCH>09). Máximo 1 aplicação por ciclo cultural no combate à áltica e 2 aplicações no combate à piral, com 12 dias de intervalo. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha.	10 (máx. 100 mL/ha)	14
	Piral-da-vinha (<i>Sparganothis pilleriana</i>)	Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	7,5 (máx. 75 mL/ha)	
	Traça-dos-cachos (<i>Eupoecilia ambiguella</i> , <i>Lobesia botrana</i>)	Sempre que exista, efetue os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento, preferencialmente na altura da eclosão dos ovos. No combate às traças da vinha dirija a pulverização aos cachos. Máximo 1 ou 2 tratamentos para o conjunto dos inimigos por ciclo cultural. Não ultrapassar a dose total de 150 mL/ha.	10 (máx. 100 mL/ha)	
	Mosca-do-Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.	10 (máx. 100 mL/ha)	

Culturas	Praga	Condições de utilização	Conc. (mL/hL) / dose (máx. mL/ha)	Intervalo de segurança (dias)
Trigo-mole Trigo-duro Aveia Cevada	Afídeo-russo-do-trigo (<i>Diuraphis noxia</i>)	Aplicar na presença da praga e/ou estragos. Máximo 2 aplicações para o conjunto dos inimigos, por ciclo cultural, com intervalo de 14 dias entre aplicações.	75 mL/ha	28
	Afídeo (<i>Metopolophium dirhodum</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Schizaphis graminum</i>)			
	Afídeo-da-espiga-do-trigo (<i>Sitobion avenae</i>)			

Volume de calda: 1000 L/ha para todas as culturas, exceto morangueiro de ar livre: 200-700 L/ha

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Dado o risco intrínseco do aparecimento de resistências a qualquer inseticida, recomenda-se o uso de **NIN-JA® with Zeon technology** segundo um programa anti-resistência que compreenda a utilização de outros inseticidas com diferentes modos de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA. MODO DE APLICAÇÃO.

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas:

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/ doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.