BANJO ®

ADAMA

® Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA

FUNGICIDA | **SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)**

Composição

- Fluaziname ..... 500 g/L ou 39.9% (p/p)

Culturas

Batateira, Videira, Macieira, Pereira ... (para outras culturas ver interior do rótulo)

Informação importante

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de venda N.º: 1199 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. D. João II, Edifício Adamastor
Torre B, nº 9-1-13º piso
1990-079 Lisboa - Tel.+351 924 036 454

LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: (ver impresso).

Digitalizar para mais informação

valorfito

AGITAR BEM ANTES DE USAR

NO VARNISH AREA

L30113IPFR_02

5 Litros

SPECIMEN

Product name	BANJO ®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30113IPFR_02		
Label dimensions (w × h)	170mm × 150mm	Name	
Label date	13:02:38 16.02.26	Status	
Smallest font on page	6.29 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

BANJO®

® Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA

FUNGICIDA | **SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)**

Composição

- Fluaziname ..... 500 g/L ou 39.9% (p/p)

Culturas

Batateira, Videira, Macieira, Pereira ... (para outras culturas ver interior do rótulo)

Informação importante

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de venda N.°: 1199 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. D. João II, Edifício Adamastor
Torre B, nº 9-1-13º piso
1990-079 Lisboa - Tel.+351 924 036 454

LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: (ver impresso).

Digitalizar para mais informação

valorfito

AGITAR BEM ANTES DE USAR

5 600891 162013

GRUPO 29 FUNGICIDA

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H361d - Suspeito de afetar o nascituro.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 - Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.
P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P391 - Recolher o produto derramado.
P405 - Armazenar em local fechado à chave.
P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH208 - Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e fluaziname. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30metros em relação às águas de superfície, incluindo 30 metros de coberto vegetal, em macieira e pereira.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20metros em relação às águas de superfície, incluindo 20 metros de coberto vegetal, em videira.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície, incluindo 10 metros de coberto vegetal, em batateira.
SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção com capucho e máscara respiratória durante a preparação da calda, a aplicação do produto e manutenção do equipamento de aplicação do produto. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.
SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
SPoPT7i- Intervalo de reentrada para atividades de manutenção das culturas (até 6 H por dia): 17 dias após a aplicação para videira e 5 dias após aplicação para pomoideas
SPoPT7ii - Intervalo de reentrada para videiras, colheita (até 6 H por dia): 21 dias após a aplicação.
SPoPT8 - Para proteção de pessoas estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecida uma zona tampão de 10 metros entre as culturas e estradas, habitações, edifícios públicos, jardins públicos e espaços públicos.
SPoPT9 - Não são permitidas aplicações com pulverizador de dorso.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



ATENÇÃO

ADAMA

L30113OCFR_02

4 × 5 Litros

SPECIMEN

Product name	BANJO ®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30113OCFR_02		
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	Name	
Label date	13:02:38 16.02.26	Status	
Smallest font on page	7.1 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

BANJO ®

ADAMA

FUNGICIDA

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

L30113IPBB_02

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H361d - Suspeito de afetar o nascituro.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 - Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.
P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P391 - Recolher o produto derramado.
P405 - Armazenar em local fechado à chave.
P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH208 - Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e fluaziname. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30metros em relação às águas de superfície, incluindo 30 metros de coberto vegetal, em macieira e pereira.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20metros em relação às águas de superfície, incluindo 20 metros de coberto vegetal, em videira.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície, incluindo 10 metros de coberto vegetal, em batateira.



ATENÇÃO

GRUPO 29 FUNGICIDA

SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção com capucho e máscara respiratória durante a preparação da calda, a aplicação do produto e manutenção do equipamento de aplicação do produto. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.
SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
SPoPT7i- Intervalo de reentrada para atividades de manutenção das culturas (até 6 H por dia): 17 dias após a aplicação para videira e 5 dias após aplicação para pomoideas
SPoPT7ii - Intervalo de reentrada para videiras, colheita (até 6 H por dia): 21 dias após a aplicação.
SPoPT8 - Para proteção de pessoas estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecida uma zona tampão de 10 metros entre as culturas e estradas, habitações, edifícios públicos, jardins públicos e espaços públicos.
SPoPT9 - Não são permitidas aplicações com pulverizador de dorso.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

UFI: 5S96-JNMN-DQ0W-U68C

5 600891 162006

Utilização do produto | **Características biológicas** | **Recomendações de uso**

SPECIMEN

Product name	BANJO ®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30113IPBB_02		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	13:02:38 16.02.26	Status	
Smallest font on page	6.47 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

BANJO ®

ADAMA

FUNGICIDA

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

GRUPO 29 FUNGICIDA

L30113IPBB_02

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H361d - Suspeito de afetar o nascituro.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 - Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.
P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P391 - Recolher o produto derramado.
P405 - Armazenar em local fechado à chave.
P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH208 - Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e fluaziname. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30metros em relação às águas de superfície, incluindo 30 metros de coberto vegetal, em macieira e pereira.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20metros em relação às águas de superfície, incluindo 20 metros de coberto vegetal, em videira.
SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície, incluindo 10 metros de coberto vegetal, em batateira.
SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção com capucho e máscara respiratória durante a preparação da calda, a aplicação do produto e manutenção do equipamento de aplicação do produto. Usar trator com cabine fechada durante a aplicação do produto.
SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
SPoPT7i- Intervalo de reentrada para atividades de manutenção das culturas (até 6 H por dia): 17 dias após a aplicação para videira e 5 dias após aplicação para pomoideas
SPoPT7ii - Intervalo de reentrada para videiras, colheita (até 6 H por dia): 21 dias após a aplicação.
SPoPT8 - Para proteção de pessoas estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecida uma zona tampão de 10 metros entre as culturas e estradas, habitações, edifícios públicos, jardins públicos e espaços públicos.
SPoPT9 - Não são permitidas aplicações com pulverizador de dorso.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



ATENÇÃO

UFI: 5S96-JNMN-DQ0W-U68C

5 600891 162006

SPECIMEN

Product name	BANJO ®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30113IPBB_02		
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Name	
Label date	13:02:38 16.02.26	Status	
Smallest font on page	6.69 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

BANJO® contém fluaziname, pertencente ao grupo químico das 2,6- dinitroanilinas. É um fungicida de superfície, multi-sítio, com atividade preventiva, inibe a germinação dos esporos e com alguma actividade sobre a formação dos esporos.

CLASSIFICAÇÃO DO MODO DE AÇÃO DA SUBSTÂNCIA ATIVA DE ACORDO FRAC

GRUPO	29	FUNGICIDA

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, quando estes existirem.

CULTURAS	DOENÇA	CONCENTRAÇÃO/ DOSE	CONDIÇÕES DE UTLIZAÇÃO
BATATEIRA	**Míldio** (*Phytophthora infestans*)	0.3 a 0.4 L/ha	As aplicações devem ser iniciadas ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 10-91). Realizar no máximo 10 tratamentos por ano com intervalos de 7 a 10 dias.
VIDEIRA (uva para vinificação)	**Podridão dos cachos** (*Botrytis cinérea*)	100-150 mL/hL (no máximo 1,5 L/ha)	Realizar apenas um tratamento por ano à floração-alimpa ou ao pintor ou até 21 dias antes da colheita (BBCH 60-85). Intervalo de reentrada: 21 dias.
	Míldio (*Plasmopora vitícola*)		Tratar preventivamente desde os botões florais separados até 21 dias antes da colheita. Realizar apenas um tratamento por ano com este produto (BBCH 60-85). Intervalo de reentrada: 21 dias.
MACIEIRA	**Pedrado** (*Venturia inaequalis*) e **Alternariose** (*Alternaria mali*)	0.7 a 1 L/ha	Aplicar em condições de maior incidência da doença, iniciando as aplicações após a fase do botão rosa até ao final do crescimento do fruto (BBCH 57-79). Realizar no máximo 3 tratamentos, no conjunto das doenças com intervalos de 14 dias. Intervalo de reentrada: 5 dias.
PEREIRA	**Pedrado** (*Venturia pyrina*), **Alternariose** (*Alternaria alternata*) e **Estenfiliose** (*Stemphylium vesicarium*)		

ALARGAMENTO DE ESPECTRO POR USO MENOR:

A eficácia e a fitotoxidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

NESPEREIRA, MARMELEIRO – **Pedrado** (*Venturia inaequalis*): 70-100 mL/hL. Aplicar em condições de maior incidência da doença, iniciando as operações após a fase do botão rosa (BBCH 57-75). Realizar no máximo 3 tratamentos com intervalos de 14 dias. Em cada aplicação não ultrapassar a dose máxima de 1L de Banjo/ha.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Batateira -7 dias; Videira - 21 dias; Macieira, Pereira, Marmeleiro e Nespereira - 60 dias.

SPECIMEN

Product name	BANJO ®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	13:02:38 16.02.26	Status	
Smallest font on page	7 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade de distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.
Volume de calda: Batateira 600-1000 L/ha; Videira 200-1000 L/ha;
Macieira, Pereira, Marmeleiro, Nespereira 1000-1500 L/ha.

SPECIMEN