SPHINX® MZ

GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA (WG)

dimetomorfe 90 g/kg ou 9% (p/p)
mancozebe 600 g/kg ou 60% (p/p)
Contém metenamina

Culturas

Videira, batateira
e tomateiro.

FUNGICIDA
Anti-míldio

Autorização de venda nº 0565
concedida pela DGAV.
Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. Miguel Bombarda, nº36 - 2ºC
1050-165 Lisboa - Telf.: 217 166 861

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Data de produção e Lote nº (ver impresso)

ADAMA
ESSENTIALS

5 kg

PT162636 P-R8

SPECIMEN

SPHINX® MZ

GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA (WG)

COMPOSIÇÃO
dimetomorfe 90 g/kg ou 9% (p/p)
mancozebe 600 g/kg ou 60% (p/p)
Contém metenamina

O **SPHINX MZ** é um fungicida que contém duas substâncias ativas: o mancozebe, fungicida de superfície, pertencente ao grupo dos ditiocarbamatos, inibe vários processos metabólicos, atuando em diversas enzimas e o dimetomorfe, fungicida sistémico, derivado do ácido cinâmico (CAA), inibe a biossíntese dos fosfolípidos e a sua deposição na parece celular. Fungicida com atividade preventiva e curativa.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com FRAC:

GRUPO	40	M03	FUNGICIDA

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES / DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOENÇAS	CONCENTRAÇÃO g/100L de água DOSE L/ha	CONDIÇÕES DE UTLIZAÇÃO	I.S. días
Batateira	Míldio *(Phytophthora infestans)*	200 (não devendo ultrapassar 2 kg/ha)	Seguir as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos, desde as 3 folhas e sempre que as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença. A persistência biológica do fungicida é de 10 a 12 dias, usar o intervalo mais curto em condições de maior pressão da doença. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não efetuar mais de 3 tratamentos com este produto e outros fungicidas do grupo CAA.	7
Tomateiro (ar livre)				10
Videira (uva de mesa)	Míldio *(Plasmopora vitícola)*	200 a 250 (não devendo ultrapassar 2,5 kg/ha)	Seguir as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos no estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados enquanto as condições climáticas favorecerem a doença. A persistência biológica do fungicida é de 10 a 12 dias, usar o intervalo mais curto em condições de maior pressão da doença. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não efetuar mais de 3 tratamentos com este produto e outros fungicidas do grupo CAA.	28

I.S. Intervalo de segurança

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento das resistências, não efectuar com este produto ou outros fungicidas do grupo CAA mais de 3 tratamentos por época cultural em videira e 3 tratamentos por época cultural em batateira e tomateiro.
Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida ou outros CAA. Alternar o uso do produto com fungicidas de diferente modo de acção.
Em tomateiro não aplicar em tomate para indústria.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda a utilizar: Videira: 500-1000 L/ha; Batateira e Tomateiro: 400-1000 L/ha

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H361d - Suspeito de afetar o nascituro.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros..
P264 - Lavar o material de proteção e os objetos contaminados cuidadosamente após manuseamento.
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em local adequado à recolha de resíduos perigosos
. Ficha de segurança fornecida a pedido.
. Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
. Para proteção de organismos aquáticos não visados, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 5 metros em batateira e tomateiro e 10 metros em videira.
. Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas (não cultivadas) circunvizinhas.
. Não ultrapassar o número máximo de aplicações indicado, com este ou outros produtos com substâncias ativas do grupo dos ditiocarbamatos (mancozebe, metirame, propinebe, tirame ou zirame).

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telf: 800 250 250

Nota
Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

valorfito

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de recolha autorizado.

ATENÇÃO

Autorização de venda nº 0565 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. Miguel Bombarda, nº36 - 2ºC
1050-165 Lisboa - Telf.: 217 166 861

Sphinx é uma marca registada por uma empresa do grupo ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

5 600891 161016

PT162636 S-R8

SPECIMEN