

Front Label

140x108mm

BREVIS®

GRÂNULOS SOLÚVEIS (SG)

COMPOSIÇÃO

metamitrão 150 g/kg
ou 15% (p/p)



REGULADOR
DE CRESCIMENTO

Culturas

Macieira...

(para a outra cultura
ver interior do rótulo).



1 kg

ADAMA

S5435B01
R09 PT-A

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Data de produção e Lote n° (ver impresso)

Autorização de Venda n° 00689
concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.

Av. Defensores de Chaves, n°15 - 5°B,
1000-109 Lisboa
Telf.: 217 166 861

Base label

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Nocivo por ingestão • Provoca lesões oculares graves • Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto • Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular • SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolhe de resíduos perigosos • Ficha de segurança fornecida a pedido • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar: camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos • O aplicador deverá usar: luvas de proteção e proteção ocular durante a preparação da calda e contacto com superfícies contaminadas; luvas de proteção, vestuário de proteção com capucho e botas de borracha durante a aplicação do produto • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado • Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telf.: 800 250 250

Autorização de Venda nº 00689
concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. Defensores de Chaves, nº15
5ºB,

1000-109 Lisboa
Telf.: 217 166 861



PERIGO



R09 PT-D T5435B01

140mm

108mm

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda: 1000 a 1500 L/ha.

NOTA

As recomendações e informações que se mencionam foram baseadas em ensaios e estudos rigorosos, e na nossa experiência o que nos conduziu a um conhecimento profundo deste produto. No entanto, na sua utilização podem intervir numerosos factores que escapam ao nosso controlo (as variedades sobre as quais se aplica e a sua sensibilidade à monda química, a aplicação e utilização do produto diferente da recomendada no rótulo, a realização de misturas e a presença de outros compostos não compatíveis ou não habituais num programa de tratamentos, condições climatéricas antes e depois da aplicação, floração, polinização, fertilização do solo, factores ambientais, manuseamento da cultura, idade/ vigor/ estado sanitário da cultura, etc...). O utilizador será responsável dos danos causados (falta de eficácia, toxicidade no geral, resíduos, ou outras consequências não desejadas incluindo o monda em excesso) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo. A empresa garante a composição,

formulação e o teor no momento da entrega. O cliente deverá informar a Adama imediatamente de qualquer violação da garantia e proporcionar uma descrição detalhada do problema existente. Ter em conta que o compromisso da empresa está relacionado com o conteúdo descrito no rótulo e não pode ser alterado pelos nossos funcionários, técnicos, ou prescritores, durante a supervisão, assistência ou recomendações relativas a este produto.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Brevis é uma marca registada por uma empresa do grupo ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Nocivo por ingestão • Provoca lesões oculares graves • Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto • Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular • SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolhe de resíduos perigosos • Ficha de segurança fornecida a pedido • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar: camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos • O aplicador deverá usar: luvas de proteção e proteção ocular durante a preparação da calda e contacto com superfícies contaminadas; luvas de proteção, vestuário de proteção com capucho e botas de borracha durante a aplicação do produto • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado • Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telf: 800 250 250

Autorização de Venda nº 00689
concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. Defensores de Chaves, nº15
5ºB,
1000-109 Lisboa
Telf.: 217 166 861

5 600891 161054

PERIGO

BREVIS®**GRÂNULOS SOLÚVEIS (SG)****COMPOSIÇÃO****metamitrão 150 g/kg ou 15% (p/p)**

BREVIS é um regulador de crescimento que atua como indutor da monda química dos frutos na **macieira** e **pereira**. Pertencente à família triazinona e atua influenciando a fisiologia da planta inibindo o transporte dos eletrões no fotossistema II, reduzindo a fotossíntese. Os frutos mais fracos, ou seja, frutos com a menor taxa de crescimento e aqueles sem sementes caem primeiro. **BREVIS** intensifica a queda destes frutos e, assim, melhora a qualidade dos frutos restantes.

UTILIZAÇÕES, DOSES, CONDIÇÕES e ÉPOCAS DE APLICAÇÃO

Macieira e Pereira: 1,1 a 2,2 kg/ha; fazer um primeiro tratamento logo após a floração e repetir 5 a 10 dias depois. Aplicar o produto às partes aéreas das plantas utilizando uma quantidade de calda que assegure um bom recobrimento e evite o escorrimento.

OBSERVAÇÕES

Devido ao seu mecanismo de ação como inibidor da fotossíntese, a atividade do produto varia dependendo das condições climáticas (especialmente os níveis de radiação solar) antes, durante e depois da aplicação e do vigor da cultura. Antes de decidir o momento da aplicação do Brevis, recomenda-se verificar quais as previsões climáticas diárias na estação meteorológica na semana anterior e nas 2 que seguem à aplicação. Tempo nublado e temperaturas noturnas elevadas (>10°C) na semana anterior e depois da aplicação podem aumentar o efeito da monda, nestas condições as doses de aplicação devem ser adaptadas.

INTERVALO DE SEGURANÇA – Macieira e Pereira: 60 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências deverá alternar com outros produtos com diferente modo de ação. Deve aplicar-se com temperaturas superiores a 10°C e evitar o uso do produto com temperaturas superiores a 25°C. Não aplicar BREVIS durante os 5 dias após queda de geada ou que se preveja a sua ocorrência. O produto não deve ser aplicado sobre folhas húmidas, pelo que não se deve realizar a sua aplicação nem demasiado cedo nem após chuva. Chuvas ocorridas 2 horas depois da aplicação não influenciam a eficácia do produto. Não aplicar BREVIS em mistura com outros produtos. Adama não se responsabiliza pelo danos derivados de uma

utilização do produto em mistura em tanque ou em combinação com outros programas de monda química. Óleos de verão, adjuvantes, alguns produtos fitossanitários à base de azeite, prohexadiona de cálcio. Fungicidas inibidores de succinato desidrogenase (SDHI), e outros produtos (por exemplo aminoácidos) podem aumentar o efeito da monda. Não aplicar herbicidas que sejam muito voláteis nos 7 dias anteriores e posteriores à aplicação já que pode aumentar o efeito negativo da clorose nas folhas. Não aplicar BREVIS em árvores submetidas a stress: hídrico, nutricional (carências, adubação deficiente), pragas ou doenças do solo e/ou ambientais. Evitar a deriva da pulverização para culturas não visadas, especialmente prunóideas que são muito sensíveis (danos nas folhas). Prestar especial atenção em realizar a aplicação sem vento e utilizando bicos anti-deriva.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).