GLYPHOGAN®

SOLUÇÃO CONCENTRADA (SL)
glifosato 360 g/L ou 30,9% (p/p)
(sob a forma de sal de isopropilamónio)

Autorização de venda nº 0163
concedida pela DGAV.
Titular da Autorização de Venda:
ADAMA PORTUGAL, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Data de produção e Lote nº (ver impresso)

HERBICIDA

ADAMA
ESSENTIALS

⊕ 161361 R12 PT

1 Litro

GLYPHOGAN® é um herbicida não seletivo de ação sistémica para o controlo de infestantes anuais e vivazes da vinha, pomares de amendoeiras, aveleiras, bananeiras, cerejeiras, citrinos, damasqueiros, macieiras, pereiras, pessegueiros, oliveira, marachas dos arrozais, pousios, renovação de pastagens, antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira directa, mas sempre antes da emergência da cultura, zonas não cultivadas. Combate igualmente as infestantes aquáticas e o rabo-de-raposa na cultura da faveira.

Classificação do modo de ação da substância ativa de acordo com WSSA (HRAC): GRUPO 9(G) HERBICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

DOSES DE APLICAÇÃO *

	(L/ha)
Infestantes anuais	2-4
Erva-pata *(Oxalis pes-caprae)*	4-5
Escalracho *(Panicum repens)*	4-7
Graminhão *(Paspalum paspalodes)*	5-8
Urtigas *(Urtica spp.)*	5-8
Corriola *(Convolvulus arvensis)*	6-8
Caniço *(Phragmites australis)*	6-8
Silvas *(Rubus spp.)*	6-8
Feto *(Pteridium aquilinum)*	6-8
Jacinto aquático *(Eichornia crassipes)*	6-8
Acácias *(Acacia spp.)*	6-8
Arroz-bravo *(Leerzia oryzoides)*	6-8
Grama *(Cynodon dactylon)*	8-10
Junça *(Cyperus rotundus)*	8-10
Juncinha *(Cyperus esculentus)*	8-10
Tabua-larga *(Thypha latifolia)*	8-10
Rabo-de-raposa *(Orobanche spp.)*	130 ml

* No caso de aplicações localizadas sobre manchas de infestantes, aplicar caldas de GLYPHOGAN® à razão de 1,5%.
* As doses mais elevadas são recomendadas para infestações mais intensas e desenvolvidas.
* No caso da junça e juncinha, uma vez que o seu desenvolvimento se verifica durante um longo período de tempo, poderá ser conveniente efectuar duas aplicações. Na primeira aplicar-se-á 6 L/ha e na segunda 3 L/ha de GLYPHOGAN®.
* Antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira directa, mas sempre antes da emergência da cultura, para controlo de infestantes anuais nas primeiras fase de desenvolvimento, também pode ser usadas as doses de 0,75 L a 1,5 L/ha.

Infestantes anuais: A aplicação deverá ser realizada nas fases iniciais do crescimento das infestantes.
Infestantes vivazes: A aplicação deve ser feita quando as infestantes se encontram no máximo do seu desenvolvimento vegetativo, o que corresponde ao início da floração.

Marachas dos arrozais: Aplicar após a colheita do arroz, enquanto as infestantes estiverem verdes ou durante o ciclo da cultura em aplicações localizadas (com campânula).
Fetos: Aplicar quando as folhas estiverem abertas, mas ainda bem verdes.
Rabo-de-raposa na cultura da faveira: Aplicar quando nas raízes da faveira aparecerem os primeiros "tubérculos" ou "gomos"de desenvolvimento da planta parasita (em regra surgem a partir da floração da cultura, a partir da qual, se deve observar as raízes das faveiras (em amostras colhidas 2 vezes por semana). Repetir a aplicação 15 dias mais tarde.
Silvas: A aplicação deve ser logo a seguir à maturação da amora. Estas não devem ser cortadas previamente, caso não haja possibilidade de fazer uma aplicação nas silvas em Setembro/Outubro, poder-se-á fazer uma mais tardia (Novembro) desde que estas tenham as folhas verdes.
Caniços: A aplicação deve ser efectuada no início da floração.
Infestantes aquáticas: Os melhores resultados obtêm-se em aplicações em Junho/Julho.

INTERVALO DE SEGURANÇA: 7 dias em amendoeira e aveleira; 21 dias em faveira; 28 dias em bananeira, cerejeira, citrinos, damasqueiro, macieira, oliveira, pereira, pessegueiro e videira.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente suscetíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas mistos ou alternância de herbicidas com modo de ação diferente do glifosato • Não aplicar este herbicida quando se prevê chuva nas 6 horas seguintes à aplicação • Não mobilizar o terreno nas primeiras 3 a 4 semanas após a aplicação para controlo de vivazes e, no caso de anuais, nas primeiras 48 horas • Durante a aplicação não atingir as plantas cultivadas (folhas, ramos ou frutos e ainda as raízes no caso da bananeira), a fim de evitar possíveis danos ou mesmo a sua destruição • Não aplicar junto a videiras e árvores de fruto que ainda apresentem clorofila (cor verde) nos caules e troncos • Não aplicar em vinha e pomares com menos de 3 anos • Não atingir culturas vizinhas da área a tratar • Não misturar às caldas de GLYPHOGAN qualquer outro produto, a fim de evitar uma quebra de eficácia.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO: Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade de distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda a utilizar: 200 a 600 L/ha
A utilização de baixos volumes de calda aumenta geralmente a eficácia dos tratamentos.
Após a aplicação, lavar o material várias vezes com água e detergente, incluindo bicos e filtros que devem ser lavados separadamente.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto • P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos • Ficha de segurança fornecida pedido • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem, exceto em canais e valas nas doses indicadas • Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação a águas de superfície • Armazenamento: manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Glyphogan é uma marca registada por uma empresa do grupo ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

5 600891 160491

Autorização de Venda nº 0163
concedida pela DGAV
Titular da Autorização de Venda:
ADAMA PORTUGAL, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

SPECIMEN