VINOSTAR®

GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA (WG)
dimetomorfe 113 g/kg ou 11,3% (p/p)
folpete 600 g/kg ou 60% (p/p)

Fungicida anti-míldio

Culturas
Tomateiro e videira.

FUNGICIDA

Autorização de venda nº 0509
concedida pela DGAV.
Titular da Autorização de Venda:
ADAMA PORTUGAL, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Data de produção e Lote nº (ver impresso)

ADAMA
ESSENTIALS

5 kg

161885 R08 PT-B

SPECIMEN

VINOSTAR®

FUNGICIDA

GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA (WG)

COMPOSIÇÃO
dimetomorfe 113 g/kg ou 11,3% (p/p)
folpete 600 g/kg ou 60% (p/p)

Fungicida sistémico e de superfície, com atividade preventiva e curativa. Inibe a biossíntese de fosfolípidos e a sua decomposição na parede celular (CAA) e inibe vários processos metabólicos, actuando em diversas enzimas.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com FRAC:

GRUPO	40	H5 M	FUNGICIDA

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES / DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOENÇA	Concentração g/100L água DOSE kg/ha	CONDIÇÕES DE UTLIZAÇÃO	I.S. días
Tomateiro	Míldio *(Phytophthora infestans)*	1,7 kg/ha	Seguir as recomendações do Serviço de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar as aplicações, desde as 3 folhas e sempre que as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença. A persistência biológica do VINOSTAR® é de 10-12 dias. Não realizar mais de 3 tratamentos com este ou outros fungicidas contendo CAA. Não usar em tomate destinado a transformação industrial.	7 (ar livre)
Videira (uva para vinificação)	Míldio *(Plasmopora vitícola)*	130-160 g/hL (máximo 1,6 kg/ha)	Seguir as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos no estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados enquanto as condições climáticas favorecerem a doença. A persistência biológica do VINOSTAR® é de 10-12 dias, sendo 10 dias em condições de maior pressão da doença. Não realizar mais de 3 tratamentos com este ou outros fungicidas contendo CAA.	42

I.S. Intervalo de segurança; N.A. não aplicável

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Não realizar mais de 3 tratamentos por campanha com este ou outro fungicida contendo CAA.
Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida do produto.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
H319 –Provoca irritação ocular grave.
H351 - Suspeito de provocar cancro.
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 - Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Contém folpete. Pode provocar uma reacção alérgica.
Não poluir a água com este produto ou a sua embalagem.
Manter em local seco, ventilado e protegido por raios solares.
Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado.
Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250.

valorfito

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetiveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ATENÇÃO

Autorização de venda nº 0509 concedida pela DGAV
Titular da Autorização de Venda:
ADAMA PORTUGAL, Lda.
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

Vinostar é uma marca registada por uma empresa do grupo ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

5 600891 160941

161885 R08 PT-C

SPECIMEN