

SIROCO®



HERBÍCIDA
Pós-emergência

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

diflufenicão 40 g/L ou 3.50% (p/p)
glifosato 250 g/L ou 21.80% (p/p)

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Lote nº e Data de produção (ver impresso)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P391 - Recolher o produto derramado.

P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda durante a aplicação do produto.

Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros.

Impedir o acesso de pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250.

PT 162323 S-R3



ATENÇÃO

Autorização de Venda nº 0683 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA Portugal, Lda.

Av. Miguel Bombarda, nº36 - 2°C
1050-165 Lisboa - Telf.: 217 166 861



5 Litros



SIROCO®



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

diflufenicão 40 g/L ou 3.50% (p/p)
glifosato 250 g/L ou 21.80% (p/p)

Nota

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de Venda nº 0683 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA Portugal, Lda.
Av. Miguel Bombarda, nº36 - 2°C
1050-165 Lisboa
Telf.: 217 166 861

Siroco é uma marca registada
por uma empresa do grupo
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

SIROCO®



HERBICIDA
Pós-emergência

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

diflufenicão 40 g/L ou 3.50% (p/p)
glifosato 250 g/L ou 21.80% (p/p)

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Lote nº e Data de produção (ver impresso)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P391 -Recolher o produto derramado.

P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda durante a aplicação do produto.

Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros.

Impedir o acesso de pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250.

PT 162323 S-R3



ATENÇÃO

Autorização de Venda nº 0683 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA Portugal, Lda.
Av. Miguel Bombarda, nº36 - 2°C
1050-165 Lisboa - Telf.: 217 166 861



5 Litros



SIROCO®



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

diflufenicão 40 g/L ou 3.50% (p/p)

glifosato 250 g/L ou 21.80% (p/p)

Classificação do modo de ação das substâncias activas de acordo com WSSA (HRAC):

GRUPO 12 (F1) | 9 (G) HERBICIDA

SIROCO® é um herbicida de contacto, com efeito residual, caracterizado pela sua sistemica e amplo espectro de ação que proporciona um controlo rápido e persistente das infestantes nas culturas autorizadas.

O SIROCO® é constituído por duas substâncias ativas o glifosato e o diflufenicão que pertencem à família química dos aminoácidos e piridinocarboxamida, respetivamente.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

VIDEIRA, MACIEIRA, PEREIRA, PESSEGUIRO, NECTARINA, DAMASQUEIRO, AMEIXEIRA, CEREJEIRA, LIMOEIRO, LARANJEIRA, TANGERINEIRA, CLEMENTINA, BERGAMOTA, AMEN-DOEIRA, AVELEIRA, NOGUEIRA, OLIVEIRA.

Em aplicações generalizadas utilizar a dose de **3-4 L/ha.**

No caso de aplicações em banda, distribuir o produto ao longo das linhas do cultivo (sobre uma área até 50% da parcela) na dose de 2-3 L/ha (correspondendo a 4-6 L/superfície tratada). Em oliveira as bandas podem ocupar até 66% da parcela e a dose será de 3-4 L/ha (4,5-6 L/superfície tratada).

As infestantes deverão estar em pleno desenvolvimento vegetativo e não deverão exceder os 20 cm de altura.

ÁREAS NÃO CULTIVADAS – aplicar a dose de 4 L/ha com as infestantes em crescimento activo e com uma altura não superior a 20 cm.

INTERVALO DE SEGURANÇA – Macieira, Pereira, Limoeiro, Laranjeira, Tangerineira, Bergamota e Clementina: 14 dias; Oliveira: 21 dias.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS: agrião-menor (*Cardamine hirsuta*), alface-do-monte (*Andryala integrifolia*), assobios (*Silene latifolia*), barrilha-espinosa (*Salsola kali*), bredos (*Amaranthus* spp.), catassol (*Chenopodium album*), cevada-de-rato (*Hordeum murinum*), erva-dos-bálsamos

(*Dittrichia graveolens*), erva-febra (*Lolium rigidum*), erva-vaqueira (*Calendula arvensis*), ervilhacas (*Lathyrus* spp.), lâmio (*Lamium amplexicuale*), lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), leiteira-dentada (*Euphorbia serrata*), *Galium* spp., margaças (*Matricaria* spp.), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), milhã-verde (*Setaria viridis*), morrião-azul (*Anagallis arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), mostarda branca (*Sinapsis alba*), mostarda-dos-campos (*Sinapsis arvensis*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), papoila-peluda (*Papaver hybridum*), poas (*Poa* spp.), raspa-saias (*Picris* spp.), saramago (*Raphanus raphanistrum*), serralha-brava (*Ornithopus compressus*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), tasneirinha (*Senecio vulgaris*), trevos (*Trifolium* spp.), urtiga (*Mercurialis annua*), verónica-da-pérsia (*Veronica persica*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS: abrolhos (*Tribulus terrestres*), alfafas (*Medicago* spp.), bolsa-do-pastor (*Capsella bursa pastoris*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), cenoura-silvestre (*Daucus carota*), dente-de-leão (*Taraxacum officinale*), epilóbio (*Epilobium* spp.), *Erodium* spp., erva-azeda (*Oxalis corniculata*), erva-fome (*Cardaria draba*), erva-moira (*Solanum nigrum*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), grama (*Cynodon dactylon*), grizandras (*Diplotaxis* spp.), Hemíria hirsuta, labças (*Rumex* spp.), *Setaria* spp., língua-de-ovelha (*Plantago lanceolata*), pampilho-de-micão (*Coleostephus myconis*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), serralhas (*Sonchus* spp.), tanchagens (*Plantago* spp.), trevo-de-cheiros (*Melilotus elegans*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS: Evitar o arrastamento das caldas pulverizadas para as parcelas vizinhas. Se necessário remover os rebentos da base das culturas. Não aplicar durante a floração em videira, pomoideas e prunoideas. A eficácia do produto pode ser afetada se ocorrer uma chuva nas primeiras 6 horas após a aplicação do produto. A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente suscetíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas com modo de ação diferente.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda: 100 a 400 L/ha.