O LEBRON é um inseticida do solo sob a forma de grânulos para aplicação ao ar livre na época da sementeira das culturas. É um inseticida piretróide de largo espetro de ação que atua essencialmente por contacto e ingestão. Possui uma pressão de vapor que permite a sua difusão no solo e uma ação residual de algumas semanas até alguns meses, assegurando uma prolongada boa eficácia do produto.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar em culturas ao ar livre através de um distribuidor de grânulos e com incorporação do produto no solo.

CULTURAS	PRAGAS	DOSE kg/ha	CONDIÇÕES DE UTLIZAÇÃO
AIPO, BERINGELA		15-20	Aplicar antes ou durante a sementeira (BBCH 00) realizando apenas uma aplicação por campanha.
ERVILHEIRA, FEIJOEIRO, GIRASSOL, MILHO, MILHO-DOCE, RÁBANO, TABACO, TOMATEIRO	**Néctuas** (*Agrotis sp*), **Alfinetes** (*Agriotes sp*), **Mosca-do-solo** (*Delia sp*), **Melolonta** (*Melolontha melolontha*)	10-15	
MELANCIA, MELOEIRO		15	
CENOURA	**Néctuas** (*Agrotis sp*), **Alfinetes** (*Agriotes sp*), **Mosca-do-solo** (*Delia sp*), **Mosca-da-cenoura** (*Psila rosae*), **Melolonta** (*Melolontha melolontha*)	10-15	
COUVE-BRÓCOLO, COUVE-DE-BRUXELAS, COUVE-FLOR, COUVE-REPOLHO, NABO	**Néctuas** (*Agrotis sp*), **Alfinetes** (*Agriotes sp*), **Potra-das-couves** (*Ceutorhynchus pleurostigma*), **Mosca-do-solo** (*Delia sp*), **Melolonta** (*Melolontha melolontha*)	10-15	
BETERRABA SACARINA	**Áltica-da-beterraba** (*Chaetocnema tibialis*)	10-15	
FUNCHO	**Néctuas** (*Agrotis sp*), **Alfinetes** (*Agriotes sp*), **Mosca-do-solo** (*Delia sp*), **Melolonta** (*Melolontha melolontha*)	15-20	
SOJA	**Néctuas** (*Agrotis sp*), **Alfinetes** (*Agriotes sp*), **Mosca-do-solo** (*Delia sp*)	12-15	
SORGO	**Néctuas** (*Agrotis sp*), **Alfinetes** (*Agriotes sp*), **Mosca-do-solo** (*Delia sp*), **Scutigerela** (*Scutigerella immaculata*)	12-15	

Alargamento de espectro por USO MENOR

RELVADOS – Lagartas (*Agrotis* spp): 10-15 kg/ha. Aplicar antes ou durante a sementeira, realizando apenas 1 aplicação através da distribuição de grânulos com incorporação no solo.

A eficácia e fitotoxicidade resultantes desta utilização menor é da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

MODO DE APLICAÇÃO

Distribuição dos grânulos com incorporação do produto no solo. Quando aplicado em grandes extensões, utilizar meios mecânicos - distribuidores de grânulos e microgrânulos. Para cálculo do débito das máquinas informa-se que a densidade do produto é 0,8.

GRUPO 3A INSETICIDA

ATENÇÃO

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros • P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo • P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização • P262 - Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa • P273 - Evitar a libertação para o ambiente • P280 - Usar luvas e vestuário de proteção • P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito • P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão sem esfregar • P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-os, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar • P391 - Recolher o produto derramado • P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos • EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido • SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem • Spe3 - Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às zonas não cultivadas • SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de: 10 m incluindo de coberto vegetal para couve-brócolo, couve-flor, couve-de-bruxelas, couve-repolho, alface, beringela, tomateiro, melancia, meloeiro; 10 m com cobertura vegetal ou 20 m sem cobertura em cenoura, rábano, nabo, couve-rábano, funcho, aipo; 10 m para feijoeiro com vagem, beterraba sacarina, girassol, tabaco, soja: 5 m para milho, milho doce, sorgo, ervilheira e relvados • Spe5 - Para proteção das aves e dos mamíferos selvagens, incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos • Spe8 - Para proteção das abelhas, não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto .Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração. Não aplicar 10 dias antes da floração • SPgPT4 - Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV), Telef.: 800 250 250.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

UFI: 978M-2D0C-UV0M-NFYE

5 600891 162143

UN 5M2/Y20/S/** E/MONDI/J-352

LEBRON®

® Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA

ADAMA

INSETICIDA **GRÂNULOS (GR)**

Inseticida do solo para proteção de diversas culturas, desde a sementeira.

COMPOSIÇÃO

- Teflutrina ..... 0,5% p/p (5 g/kg)

Culturas

Milho, tomateiro... (para outras culturas ver Utilizações).

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Autorização de Venda nº 1531 concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Avenida D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso
1990-079 Lisboa - Tel.: +351 924 036 454

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Data de produção e Lote nº (ver impresso)

Digitalizar para mais informação

valorfito

L5072BIPWP_03

10 kg

SPECIMEN