



SONAVIO®



A PEÇA-CHAVE
para o controlo de infestantes
em cenoura



HERBICIDA

ADAMA.COM

SONAVIO®

SONAVIO® é um herbicida residual e de contacto com controlo pre-emergente e pós-emergente de infestantes em estados iniciais, que proporciona um alto nível de controlo de infestantes comuns em hortícolas ao ar livre.

Atua sinergicamente em mistura com outros herbicidas registados e mantém uma elevada persistência devido à película que forma no solo.



CONTACTO

Inibe a fotossíntese de infestantes em estados iniciais já germinadas no momento da aplicação.

DUPLA AÇÃO



RESIDUAL

Através da película que forma na superfície do solo, inibe o desenvolvimento de infestantes germinadas depois do tratamento.

Composição

Bifenox 480 g/l (40,7% p/p)

Formulação

Suspensão Concentrada (SC)

Autorização de Venda nº


2261

Classificação HRAC


Grupo 14




Amaranthus spp.



Portulaca oleracea



Chenopodium spp.



Malva sp.



Senecio vulgaris




Solanum nigrum

Momento de Aplicação

PÓS-EMERGÊNCIA
(3-4 folhas)


SONAVIO®



SONAVIO®

Após a realização de múltiplos ensaios a nível europeu e local, a ADAMA demonstrou que SONAVIO®, um herbicida exclusivo e único no mercado para aplicação em pós-transplante na cultura da cenoura, apresenta elevada eficácia no controlo de dicotiledóneas difíceis.

O SONAVIO® é um herbicida fácil de usar graças à sua elevada compatibilidade e complementaridade com distintas matérias ativas.



Eficácia média 61 dias depois do tratamento B e 28 dias depois do tratamento C. Sementeira efetuada a 12/12/2024. (A) - Tratamento de pré-emergência; (B) - 1º Tratamento de pós-emergência; (C) - 2º Tratamento de pós-emergência



RÁPIDO

Elimina infestantes em estados iniciais em 5 a 7 dias.



RESIDUAL

Controla emergências até 60 dias depois do tratamento*.

* De infestantes do seu espectro de controlo.



SINÉRGICO

Atua sinergicamente aumentando a eficácia de matérias ativas aplicadas separadamente.

Eficácia da mistura de SONAVIO® (0,5 L/ha) com aclonifena 60% SC (0,5 L/ha), aplicada duas vezes com um intervalo de 6 dias, 72 dias após o último tratamento.



TESTEMUNHA



SONAVIO® + Aclonifena 60%

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Culturas	Dose / Nº Máx. tratamentos / Volume de calda	Condições de utilização
Tomateiro (<i>Solanum lycopersicum</i>)	0.8 – 1 L/ha Nº Máx. tratamentos: 1 Volume de calda: 100 – 400 L/ha	Aplicar em pré-transplantação da cultura, pelo menos 5 dias antes da transplantação (BBCH 00), de Abril a Julho.
Alface (<i>Lactuca sativa</i>), Alface-de-cordeiro (=canónigos) (<i>Valeria-nella locusta</i>), Escarola (=chicória-friswada, chicória-de-folha-larga) (<i>Cichorium endivia</i>)		Aplicar em pré-transplantação da cultura, pelo menos 5-7 dias antes da transplantação (BBCH 00)
Cenoura (<i>Daucus carota</i>)		Aplicar em pós-emergência da cultura, com 3-4 folhas verdadeiras (BBCH 13-14), de Fevereiro a Outubro
Cebola (<i>Allium cepa</i>)	0.75 – 1 L/ha Nº Máx. tratamentos: 1 Volume de calda: 100 – 400 L/ha	Aplicar após o transplante dos bolbos (BBCH 00) e pré-emergência da cultura.
Alho (<i>Allium sativum</i>)		
Chalota (<i>Allium ascalonicum</i>)		
Cebola (<i>Allium cepa</i>)	0.4 – 0.5 L/ha Nº Máx. tratamentos: 2 com 7 dias de intervalo entre as aplicações. Volume de calda: 100 – 400 L/ha	Aplicar com a cultura com 3 – 4 folhas verdadeiras (BBCH 13-14)
Alho (<i>Allium sativum</i>)		
Chalota (<i>Allium ascalonicum</i>)		
Alcachofra (<i>Cynara scolymus</i>)	0.8 – 1 L/ha Nº Máx. tratamentos: 1 Volume de calda: 100 – 400 L/ha	Aplicar em pré-transplantação da cultura (BBCH 00), de Agosto a Janeiro
		Aplicar durante o repouso vegetativo da cultura (BBCH 90-00), de Agosto a Janeiro
Salsa (<i>Petroselinum crispum</i>)	0.8 – 1 L/ha Nº Máx. tratamentos: 1 Volume de calda: 100 – 400 L/ha	Aplicar em pré-transplantação da cultura, pelo menos 5 – 7 dias antes da transplantação (BBCH 00)

INTERVALO DE SEGURANÇA: coberto pela época de aplicação.

- No momento da aplicação devem existir boas condições de humidade que permitam a incorporação do produto.
- O SONAVIO® pode causar manchas nas folhas inferiores da cultura. Dada a sua baixa mobilidade na planta, os efeitos observados foram transitórios e não tiveram impacto na qualidade final nem no rendimento da cultura.
- Não aplicar SONAVIO® se forem esperadas chuvas fortes e localizadas.
- Chuvas fortes e localizadas, até 60 dias após a aplicação, podem causar fitotoxicidade na cultura sob a forma de descoloração, necrose ocasional e/ou perda de vigor.
- O SONAVIO® forma uma película no solo. A sua alteração (por exemplo, através de mobilização do solo após a aplicação) provocará uma redução significativa da eficácia.



Escutamos • Entendemos • Respondemos

ADAMA Portugal, Lda. | Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso | 1990-079 Lisboa | Portugal | adama.com

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o rótulo. Uso restrito a agricultores e aplicadores profissionais. O conteúdo deste folheto tem apenas fins informativos, atualizado em Fevereiro de 2026, e em nenhum caso substitui as recomendações e informações contidas no rótulo. As informações contidas no rótulo prevalecerão sobre qualquer outro tipo de informação em caso de divergência.