

| UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culturas                                                                                                                                                                                         | Dose/<br>Nº Máx. tratamentos/<br>Volume de calda                           | Condições de utilização                                                                                          |
| Tomateiro ( <i>Solanum lycopersicum</i> )                                                                                                                                                        | 0.8 – 1 L/ha<br>Nº Máx. tratamentos: 1<br>Volume de calda: 100 – 400 L/ha  | Aplicar em pré-transplantação da cultura, pelo menos 5 dias antes da transplantação (BBCH 00), de Abril a Julho. |
| Alface ( <i>Lactuca sativa</i> ),<br>Alface-de-cordeiro (=canónigos)<br>( <i>Valeria-nella locusta</i> ),<br>Escarola (=chicória-friswada, chicória-de-folha-larga) ( <i>Cichorium endivia</i> ) |                                                                            | Aplicar em pré-transplantação da cultura, pelo menos 5-7 dias antes da transplantação (BBCH 00)                  |
| Cenoura ( <i>Daucus carota</i> )                                                                                                                                                                 |                                                                            | Aplicar em pós-emergência da cultura, com 3-4 folhas verdadeiras (BBCH 13-14), de Fevereiro a Outubro            |
| Cebola ( <i>Allium cepa</i> )<br>Alho ( <i>Allium sativum</i> )<br>Chalota ( <i>Allium ascalonicum</i> )                                                                                         | 0.75 – 1 L/ha<br>Nº Máx. tratamentos: 1<br>Volume de calda: 100 – 400 L/ha | Aplicar após o transplante dos bolbos (BBCH 00) e pré-emergência da cultura.                                     |
| Cebola ( <i>Allium cepa</i> )<br>Alho ( <i>Allium sativum</i> )<br>Chalota ( <i>Allium ascalonicum</i> )                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                  |
| Cebola ( <i>Allium cepa</i> )<br>Alho ( <i>Allium sativum</i> )<br>Chalota ( <i>Allium ascalonicum</i> )                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                  |
| Alcachofra ( <i>Cynara scolymus</i> )                                                                                                                                                            | 0.8 – 1 L/ha<br>Nº Máx. tratamentos: 1<br>Volume de calda: 100 – 400 L/ha  | Aplicar em pré-transplantação da cultura (BBCH 00), de Agosto a Janeiro                                          |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Aplicar durante o repouso vegetativo da cultura (BBCH 90-00), de Agosto a Janeiro                                |
| Salsa ( <i>Petroselinum crispum</i> )                                                                                                                                                            | 0.8 – 1 L/ha<br>Nº Máx. tratamentos: 1<br>Volume de calda: 100 – 400 L/ha  | Aplicar em pré-transplantação da cultura, pelo menos 5 – 7 dias antes da transplantação (BBCH 00)                |

INTERVALO DE SEGURANÇA: coberto pela épo-ca de aplicação.

- No momento da aplicação devem existir boas condições de humidade que permitam a incorporação do produto.
- O SONAVIO® pode causar manchas nas folhas inferiores da cultura. Dada a sua baixa mobilidade na planta, os efeitos observados foram transitórios e não tiveram impacto na qualidade final nem no rendimento da cultura.
- Não aplicar SONAVIO® se forem esperadas chuvas fortes e localizadas.
- Chuvas fortes e localizadas, até 60 dias após a aplicação, podem causar fitotoxicidade na cultura sob a forma de descoloração, necrose ocasional e/ou perda de vigor.
- O SONAVIO® forma uma película no solo. A sua alteração (por exemplo, através de mobilização do solo após a aplicação) provocará uma redução significativa da eficácia.



Escutamos • Entendemos • Respondemos

ADAMA Portugal, Lda. | Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso | 1990-079 Lisboa | Portugal | [adama.com](http://adama.com)

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o rótulo. Uso restrito a agricultores e aplicadores profissionais. O conteúdo deste folheto tem apenas fins informativos, atualizado em Fevereiro de 2026, e em nenhum caso substitui as recomendações e informações contidas no rótulo. As informações contidas no rótulo prevalecerão sobre qualquer outro tipo de informação em caso de divergência.

RB4670226



SONAVIO®



A PEÇA-CHAVE  
para o controlo de infestantes  
em tomate



ADAMA.COM

# SONAVIO®

SONAVIO® é um herbicida residual e de contacto com controlo pre-emergente e pós-emergente de infestantes em estados iniciais, que proporciona um alto nível de controlo de infestantes comuns em hortícolas ao ar livre.

Atua sinergicamente em mistura com outros herbicidas registados e mantém uma elevada persistência devido à película que forma no solo.



## DUPLA AÇÃO



### CONTACTO

Inibe a fotossíntese de infestantes em estados iniciais já germinadas no momento da aplicação.



### RESIDUAL

Através da película que forma na superfície do solo, inibe o desenvolvimento de infestantes germinadas depois do tratamento.

### Composição

Bifenox 480 g/l (40,7% p/p)

### Formulação

Suspensão Concentrada (SC)

### Autorização de Venda nº


2261

### Classificação HRAC

Grupo 14



*Solanum nigrum*



*Portulaca oleracea*



*Chenopodium spp.*



*Amaranthus spp.*



*Datura stramonium*



*Malva sp.*

## Momento de Aplicação

### PRÉ-TRANSPLANTE

Se se esperam chuvas ou em solos com alto teor de humidade e temperaturas máximas <25°C

### SONAVIO®

1 L/ha



SONAVIO® é um herbicida exclusivo e único no mercado para aplicação em pré-transplante na cultura do tomate de indústria, eficaz em várias infestantes dicotiledóneas difíceis de controlar como *Amaranthus spp.*, *Chenopodium spp.*, *Sonchus spp.*, *Portulaca spp.*, *Datura spp.*, *Solanum nigrum*.

SONAVIO® é um herbicida que facilita o controlo de infestantes desde o início da implementação da cultura. Devido ao seu efeito residual, controla emergências até 60 dias após o tratamento, sem deixar resíduos.



### Controlo médio de infestantes em aplicação em pré-transplante. SONAVIO® (1 L/ha)

|      |                                |      |                            |      |                                |
|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------------|
| 88,8 | <i>Amaranthus blitoides</i>    | 76,3 | <i>Daucus carota</i>       | 77,0 | <i>Persicaria lapathifolia</i> |
| 98,8 | <i>Amaranthus retroflexus</i>  | 79,4 | <i>Diploaxis erucoides</i> | 99,0 | <i>Portulaca oleracea</i>      |
| 88,8 | <i>Anagallis arvensis</i>      | 92,5 | <i>Diploaxis virgata</i>   | 79,2 | <i>Senecio vulgaris</i>        |
| 90,7 | <i>Calendula arvensis</i>      | 74,4 | <i>Fumaria officinalis</i> | 72,3 | <i>Solanum nigrum</i>          |
| 87,5 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 85,0 | <i>Lamium purpureum</i>    | 75,7 | <i>Stellaria media</i>         |
| 72,4 | <i>Chenopodium album</i>       | 80,0 | <i>Malva sp.</i>           | 93,4 | <i>Urtica urens</i>            |
| 95,0 | <i>Datura stramonium</i>       | 91,3 | <i>Papaver rhoeas</i>      | 94,0 | <i>Veronica hederifolia</i>    |

>90%

80 - 90%

70 - 80%



### RÁPIDO

Elimina infestantes em estados iniciais em 5 a 7 dias.



### RESIDUAL

Controla emergências até 60 dias depois do tratamento\*.

\* De infestantes do seu espectro de controlo.



### SINÉRGICO

Atua sinergicamente aumentando a eficácia de matérias ativas aplicadas separadamente.

Eficácia de SONAVIO® (1L/ha) aplicado em pré-transplante (26/04) 38 dias após o tratamento.

