ADAMA



INOVAȚIE SAU TRADIȚIE?

FUNGICIDE

Asorbital®

FORMULATION TECHNOLOGY

FORMULAREA FACE DIFERENȚA

Formulare nouă, dezvoltată și patentată de ADAMA, care oferă o absorbție îmbunătățită și o translocare sistemică excelentă în plantă, rezultând o eficacitate superioară a fungicidelor.

Listen ▸ Learn ▸ Deliver

ADAMA.COM

Excelența în formulare

ASORBITAL™ este un concept de formulare nou, patentat, care îmbunătățește activitatea substanțelor active, oferind o distribuție echilibrată, o mai bună absorbție în frunze și o excelentă translocare sistemică în frunze. Această formulare unică include un sistem special de solvenți și adjuvanți încorporați!

Utilizăm experiența acumulată în ferme pentru a dezvolta produse diferențiate, superioare, cu caracteristici și beneficii relevante care oferă avantaje semnificative și produc valoare adăugată.

Am dezvoltat TEHNOLOGIA DE FORMULARE ASORBITAL™ pentru că știm de la fermieri că aplicarea fungicidelor nu este întotdeauna o decizie ușoară. Fie că trebuie să decidă dacă producția scontată justifică aplicarea unui fungicid sau trebuie să ia în considerare dacă condițiile de mediu sunt potrivite pentru aplicarea unui fungicid, aceste decizii creează întotdeauna dificultăți.

Știind asta, ADAMA se concentrează pe eliminarea acestor incertitudini la aplicarea fungicidelor. Soluția a fost TEHNOLOGIA DE FORMULARE ASORBITAL™. Bazându-ne pe această tehnologie revoluționară, am reușit să utilizăm și să combinăm substanțe active de top pentru un transfer rapid al substanțelor active din punctul de contact al picăturilor de pe frunză, până la locul de acțiune în celula ciupercii patogene.

Fungicidele DMI (triazolii) ca și celelalte substanțe active, variază în ceea ce privește solubilitatea și capacitatea de a se deplasa prin stratul de ceară de pe suprafețele frunzelor, precum și mobilitatea lor în fluxul de translocare. Tipul de formulare este critic pentru determinarea eficacității și selectivității produselor aplicate.

CARACTERISTICI ASORBITAL™

Noul concept brevetat: TEHNOLOGIA DE FORMULARE ASORBITAL™ ADAMA îmbunătățește în special activitatea fungicidelor.

- **Creșterea absorbției substanțelor active**
- **Migrarea mai rapidă în țesutul frunzelor**
- **Îmbunătățirea controlului de lungă durată al bolilor**
- **Rezistență la spălare foarte bună**

POWERED BY
Asorbital®
FORMULATION TECHNOLOGY


Cele 5 beneficii ale formulării ASORBITAL

ABSORBȚIE ȘI SISTEMIE

Absorbție mai rapidă și o sistemie superioară pentru un plus de protecție


Absorbția la 6 h de la aplicare este de 4 ori mai mare comparativ cu formularea martor și o sistemie net superioară la 3 zile: +45 %

Protocol de testare: absorbție




1. Tratament pe partea bazală a frunzelor
2. Aplicarea apei - simulând precipitațiile pe frunză
3. Inocularea frunzelor cu *Zymoseptoria tritici (Septorioza)*
4. Citirea indicelui de absorbție la 28 de zile după inoculare

Rezultate de testare: absorbție




Protocol de testare: sistemie



1. Tratament pe partea bazală a frunzelor
2. Aplicarea apei - simulând precipitațiile pe frunză
3. Inoculare pe frunze cu *Zymoseptoria tritici (Septorioza)*
4. Citirea indicelui de sistemie la 21 de zile după inoculare

Rezultate de testare: sistemie




PERIOADA DE PROTECȚIE

ASORBITAL™ asigură controlul bolilor pentru o perioadă de timp îndelungată

Un control mai bun al bolilor în comparație cu formularea martor: +60% la 1 zi / +55% la 14 zile


Protocol de testare: perioada de protecție



1. Tratat cu ASORBITAL™
2-3. Inoculare cu *Septoria tritici* prin tratare la 1 zi, 7 zile și 14 zile
4. Citirea indicilor de persistență la 28 de zile de la inoculare

Teste independente BIOTRANSFER

Perioada de protecție



POWERED BY Asorbital® FORMULATION TECHNOLOGY


Formulare ASORBITAL™

TIMP PÂNĂ LA PRECIPITAȚII

ASORBITAL™ garantează eficacitatea produselor în caz de precipitații la 1h de la aplicare


Chiar și după 40 mm de ploaie, ASORBITAL™ arată un control mai bun al bolilor.

Protocol de testare



1. Tratat cu ASORBITAL™
2. Precipitații la 1h sau 2h după tratament. Ploaie de 40mm
3. Protecție timp de 21 de zile
4. Citirea indicelui de risc la 21 de zile de la tratament

Timpul de la tratament până la primele precipitații




POWERED BY Asorbital® FORMULATION TECHNOLOGY

RENTABILITATE


ASORBITAL™: garanție de performanță și rentabilitate

În peste 600 de studii europene, ASORBITAL™ oferă eficacitate semnificativ îmbunătățită în mai mult de 60% dintre cazuri pentru toate bolile. În 200 de teste BPE independente efectuate pe grâu, ASORBITAL™ asigură +380 kg/ha în comparație cu formula de referință și îmbunătățește calitatea cerealelor, cu o reducere de 10% a conținutului de micotoxine.


Spor de producție la grâu
+ 200 teste BPE europene independente



Grâu - Europa
+ 200 teste BPE europene independente




Conținut de micotoxine
din 20 studii efectuate în Europa



POWERED BY Asorbital® FORMULATION TECHNOLOGY

SIMPLITATE ȘI ECONOMIE DE TIMP

ASORBITAL™: ușor de utilizat datorită formulării EC Ultra Fluid



ADAMA

Forapro®

T1 FUNGICID CEREALE

POWERED BY

Asorbital®

FORMULATION TECHNOLOGY

Fără egal în controlul făinării!

Două substanțe active, sinergice și complementare, într-o formulare de ultimă generație. Cu activitate sistemică împotriva făinării și a complexului de boli foliare din primele faze de vegetație.

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!


FUNGICIDE
ADAMA
Listen • Learn • Deliver
ADAMA.COM

ADAMA

FORAPRO®

Formulare: emulsie concentrată (EC)
Substanță activă: Fenpropidin 250 g/L + Protioconazol 175 g/L


- Formulare revoluționară – Asorbital – formulare unică Adama, ce asigură o absorbție superioară la nivelul plantei și o eficiență de lungă durată.
- Controlează un spectru foarte larg de boli în T1 – septorioză, făinare, rugini.
- Control excelent al făinării.
- Eficacitate îmbunătățită a substanței active fenpropidin, asigurând controlul unui spectru larg de boli.

MOD DE ACȚIUNE

FORAPRO 425 EC este un fungicid sistemic ce este destinat folosirii pentru uz preventiv, curativ și eradicativ în controlul bolilor cauzate de fungi.
FORAPRO 425 EC conține două substanțe active: fenpropidin din grupa morfoline, FRAC grupa 5 și Protioconazol din grupa triazoli, FRAC grupa 3.
Fenpropidin este o substanță ce acționează ca inhibitor de biosinteză a ergosterolului în două locuri țintă (delta 14-reductaza și respectiv delta 8-7 isomeraza), fapt ce permite scăderea riscului dezvoltării rezistentelor.
Protioconazol este o moleculă ce aparține clasei triazolilor, ce conferă tratamentului o acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de agenți patogeni.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

Fungicidul **FORAPRO 425 EC** este omologat la cereale, pentru combaterea principalelor boli (septorioza, făinare, rugini) și se utilizează de la începutul fenofazei alungirii paiului (BBCH 30), până la fenofaza de înflorit deplin (BBCH 65). **FORAPRO 425 EC** oferă cele mai bune rezultate de protecție când este utilizat pentru prima intervenție, în primăvară, la culturile de cereale păioase, obținând dintr-o singură aplicare un randament ridicat în cazul presiunilor de boli cu intensitate medie și ridicată.
Se aplică maxim un tratament pe aceeași suprafață / sezon, cu echipamente profesionale de tratat și un consum de apă între 100 - 400 L / ha.



*** Rezultate din testele efectuate de Adama în Europa.

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!

FORAPRO®

FUNGICIDE

Cultură	Spectru de combatere	Doză de aplicare	Stadiul de dezvoltare a culturii	Nr. max. de tratam. / cultura/ sezon	Volum de apă/ha	Timp de pauză (zile)
Grâu de toamnă Grâu de primăvară	**Septorioza grâului** *(Septoria tritici)* **Făinare** *(Erysiphe graminis)* *Drechslera tritici-repentis* **Rugina galbenă** *(Puccinia striiformis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)*	0.8* - 1,0 L/Ha	BBCH 30-65	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Orz de toamnă Orz de primăvară	**Făinare** *(Erysiphe graminis)* **Arsura frunzelor de orz** *(Rhyncosporium secalis)* *Helminthosporium gramineum* **Rugina orzului** *(Puccinia hordei)*	0.8* - 1,0 L/Ha	BBCH 30-65	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Triticale	**Făinare** *(Erysiphe graminis)* **Septorioza grâului** *(Septoria tritici)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)* **Rugina galbenă** *(Puccinia striiformis)*	0.8* - 1,0 L/Ha	BBCH 30-65	1	100-400 l/ha	Nu se aplică

* doză în curs de omologare

ADAMA

Maxentis®

T2 FUNGICID PENTRU CEREALE, RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI*

Potențează eficacitatea împotriva bolilor!

Fungicid ready – mix, ce controlează excelent o gamă largă de boli în culturile de rapiță, cereale păioase și floarea soarelui, cu impact pozitiv în producție și profit.

* cultură în curs de omologare

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!



FUNGICIDE

Listen ▸ Learn ▸ Deliver

ADAMA.COM

ADAMA

MAXENTIS®

Formulare: suspensie concentrată (SC)
Substanţe active: Azoxistrobin 200g/L + Protioconazol 150g/L

- Combinație de substanțe active cu eficiență dovedită. Protecție de lungă durată împotriva bolilor.
- Controlează eficient în T2 – septorioză și ruginile. Efect „stay green" pronunțat.
- Eficient împotriva celor mai importante boli în cultura de floarea soarelui.

MOD DE ACȚIUNE

Azoxistrobin este o strobilurină cu un spectru larg de acțiune, cu efect antisporulant ce inhibă creșterea, dezvoltarea și germinarea sporilor și a miceliului, fiind ideal de utilizat la începutul dezvoltării infecțiilor.

Protioconazol aparține grupei chimice a trizolilor, având ca efect inhibarea biosintezei sterolilor și perturbarea structurii membranelor celulare. Protioconazolul acționează direct asupra hifelor miceliene și a germinării sporilor.

MAXENTIS acționează preventiv, curativ și eradicativ și are proprietăți translaminare și sistemice.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

În cultura cerealelor, **MAXENTIS** se aplică de la alungirea paiului până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). Alegerea momentului de aplicarea a produsului se face la apariția primelor simptome. În cazul în care schema de tratament prevede două sau mai multe aplicări de fungicid, **MAXENTIS** se va aplica la apariția frunzei stindard (BBCH 39), iar datorită efectului "Stay green" oferit de prezența strobilurinei, va îmbunătăți activitatea fiziologică a plantelor.

În cultura de rapiță aplicarea produsului se face preventiv în stadii avansate, pentru protecția inflorescenței, respectiv de la apariția butonilor florali, până când 30% din silicve au ajuns la mărimea finală (BBCH 50-73).

În cultura de floarea soarelui, **MAXENTIS** se aplică preventiv de la apariția butonului floral, până la sfârșitul perioadei de înflorire. În cazul în care schema de tratament prevede două aplicări, **MAXENTIS** se va aplica în al doilea moment de aplicare.

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!

Cultură	Spectru de combatere	Doză de aplicare	Stadiul de dezvoltare a culturii	Nr. max. de tratam. / cultura/ sezon	Volum de apă/ha	Timp de pauză (zile)
Grâu de toamnă	**Septorioza grâului** *(Septoria tritici)* **Rugina galbenă** *(Puccinia striiformis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)* **Făinarea** *(Blumeria graminis)* **Fuzarioza** *(Fusarium spp.)*	0,8-1.0 l/ha	BBCH 30-69	1	100-400 l/ ha	35
Orz	**Arsura frunzelor de orz** *(Rhyncosporium secalis)* **Pătarea reticulară a frunzelor de orz** *(Pyrenophora teres)* **Rugina orzului** *(Puccinia hordei)* **Făinarea** *(Blumeria graminis f. sp. hordei)*	0,8-1.0 l/ha	BBCH 30-65	1	150-400 l/ha	35
Secară	**Arsura frunzelor de secară** *(Rhyncosporium secalis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)*	0,8-1.0 l/ha	BBCH 30-65	1	150-400 l/ha	35
Triticale	**Putregaiul alb** *(Sclerotinia sclerotiorum)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)*	0,8-1.0 l/ha	BBCH 30-65	1	150-400 l/ha	35
Rapiță	**Putregaiul alb** *(Sclerotinia sclerotiorum)* **Alternarioza** *(Alternaria spp.)*	0,8-1.0 l/ha	BBCH 50-73	1	150-400 l/ha	42
Floarea soarelui	**Sclerotinia** ***(sclerotiorum)*** **Alternarioza** ***(Alternaria helianthi)***	0,8-1.0 l/ha	BBCH 30-69	1	200-400 l/ha	35

ADAMA

Maganic


T3 FUNGICID CEREALE ȘI RAPIȚĂ

POWERED BY Asorbital® FORMULATION TECHNOLOGY

Securizează-ți producția!

Poți sta fără griji, protecția grâului tău e garantată cu Maganic®—fungicidul care oferă un control superior asupra tuturor bolilor principale la cereale, inclusiv Fusarium.
Limitează nivelul de micotoxină și asigură calitatea cerealelor tale!

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!



FUNGICIDE

Listen • Learn • Deliver

ADAMA.COM

ADAMA

Formulare: concentrat emulsionabil (EC)
Substanţă activă: Protioconazol 175 g/L + Difenoconazol 125 g/L

MAGANIC

MOD DE ACȚIUNE

Difenoconazol face parte din clasa chimică a triazolilor, este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă. Este absorbit prin frunzele plantei și se translocă în plantă acropetal și translaminar.
Protioconazol aparține clasei triazolilor și acționează prin inhibarea sintezei sterolului. Protioconazol are un efect sistemic și asigură o protecție de lungă durată, are acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra agenților patogeni la care este omologat.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

MAGANIC este un fungicid recomandat pentru combaterea bolilor foliare și ale spicului în culturile de cereale și combaterea putregaiului negru al rapiței (*Plenodomus lingam*).

În culturile de cereale produsul se aplică începând cu apariția frunzei stindard (BBCH 39), până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69), excepție făcând orzul, la care limita maximă de aplicare este sfârșitul înspicării (BBCH 59).

La cultura de rapiță **MAGANIC** se aplică de la apariția primelor 4 frunze adevărate (BBCH 14), până la momentul când lăstarii laterali își încep dezvoltarea (BBCH 20). Pentru controlul eficient al bolilor în culturile de rapiță, utilizați la primele semne ale bolii. Dacă începeți să utilizați produsul din timp, veți avea un efect protector mai lung.

Doza produsului este cuprinsă între 0.8-1.0 L/ha pentru toate culturile omologate, fiind aplicată o singură dată pe cultură și pe sezon. Controlul bolii va avea succes dacă produsul este aplicat la momentul potrivit. Pentru evitarea formării rezistentelor se recomandă evitarea aplicării consecutive a produselor pe bază de triazoli, alternarea cu alte fungicide ce au moduri de acțiune diferite fiind recomandată.

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!

Cultură	Spectru de combatere	Doză de aplicare	Stadiul de dezvoltare a culturii	Nr. max. de tratam. / cultura/ sezon	Volum de apă/ha	Timp de pauză (zile)
Grâu de toamnă Grâu de primăvară	**Septorioza** *Zymoseptoria tritici* **Rugina galbenă** *(Puccinia striiformis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)* **Fuzarioza spicelor și mucegaiul de zăpadă** *(Fusarium si Microdochium)* **Sfârșierea frunzelor** *(Helminthosporium tritici-repentis)*	0,8-1.0 l/ha	Apariția frunzei stindard – Sfârșitul înfloritului (BBCH 39-69)	1	150-400 l/ha	Nu se aplică
Orz de toamnă Orz de primăvară	**Arsura frunzelor de orz** *(Rhyncosporium secalis)* **Pătarea reticulară a frunzelor de orz** *(Pyrenophora teres)* **Rugina orzului** *(Puccinia hordei)* *Ramularia collo-cygni*	0,8-1.0 l/ha	Apariția frunzei stindard – Începutul înfloritului (BBCH 39-59)	1	150-400 l/ha	Nu se aplică
Secară	**Arsura frunzelor de secară** *(Rhyncosporium secalis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)*	0,8-1.0 l/ha	Apariția frunzei stindard – Sfârșitul înfloritului (BBCH 39-69)	1	150-400 l/ha	Nu se aplică
Triticale	**Septorioza** *(Zymoseptoria tritici)* **Rugina galbenă** *(Puccinia striiformis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)*	0,8-1.0 l/ha	Apariția frunzei stindard – Sfârșitul înfloritului (BBCH 39-69)	1	150-400 l/ha	Nu se aplică
Rapiță	**Putregaiul negru al rapiței** *Plenodomus lingam*	0,8-1.0 l/ha	De la 4 frunze până la apariția lăstarilor laterali (BBCH 14 -20)	1	200-400 l/ha	Nu se aplică

ADAMA

SORATEL®

POWERED BY

Asorbital®

FORMULATION TECHNOLOGY

Fungicid unic, ultraperformant!

Control superior al celor mai importante boli la culturile de cereale păioase și rapiță.



INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!


FUNGICIDE
SORATEL®
Asorbital™
FORMULATION TECHNOLOGY
Asorbital™
FORMULATION TECHNOLOGY
Listen ▸ Learn ▸ Deliver
ADAMA.COM

ADAMA

Formulare: concentrat emulsionabil (EC)
Substanţă activă: protioconazol 250 g/l

SORATEL®

MOD DE ACȚIUNE

SORATEL 250 EC este un fungicid sistemic ce se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil, cu acțiune preventivă, curativă și eradicativă, eficient in combaterea bolilor, cu frecvența cea mai mare în culturile de cereale și rapiță. Produsul conține substanța activă protioconazol ce aparține clasei trizolilor, manifestându-se ca inhibitor al biosintezei sterolilor.


RECOMANDĂRI DE APLICARE

Se recomandă utilizarea produsului **SORATEL 250 EC** pentru combaterea bolilor foliare și ale spicului la cerealele păioase, dar și pentru combaterea putregaiului alb din cultura de rapiță.

Controlul bolii va avea succes dacă produsul este aplicat la momentul potrivit, ținând cont de situația câmpului (cultură) și de condițiile meteorologice.

Durata eficacității fungicide după aplicare depinde de momentul aplicării (înainte de răspândirea bolii sau de apariția primelor simptome), rata de aplicare, stadiul de creștere al plantelor, rata de creștere și condițiile climatice.

Pentru prevenirea formării rezistentelor se recomandă evitarea aplicării consecutive a produselor pe bază de triazoli și alternarea cu alte fungicide ce au moduri de acțiune diferite. Se aplică cu echipamente profesionale de pulverizat, cu un consum de 100-400 L/ha apă.




*** Rezultate din testele efectuate de Adama în Europa.

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE? AMBELE!

Cultură	Spectru de combatere	Doză de aplicare	Stadiul de dezvoltare a culturii	Nr. max. de tratam. / cultura/ sezon	Volum de apă/ha	Timp de pauză (zile)
Grâu de toamnă	**Septorioza grâului** *(Septoria tritici)* **Rugina galbenă** *(Puccinia striiformis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)* **Făinare** *(Erysiphe graminis)*	0,8l/ha	De la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69)	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
	Fuzarioza spicelor și mucegaiul de zăpadă *(Fusarium si microdochium)*	0,8l/ha	De la sfârșitul înspicării (inflorescența ieșită complet) până la sfârșitul înfloririi (BBCH 59- 69)	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Orz de toamnă Orz de primăvară	**Arsura frunzelor de orz** *(Rhyncosporium secalis)* **Pătarea reticulară a frunzelor de orz** *(Pyrenophora teres)* **Rugina orzului** *(Puccinia hordei)*	0,8l/ha	De la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea completă (BBCH 30-65)	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Secară de toamnă	**Arsura frunzelor de secară** *(Rhyncosporium secalis)* **Rugina brună** *(Puccinia recondita)*	0,8l/ha	De la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69)	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Rapiță de toamnă	**Putregaiul alb** *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0,7l/ha	Din stadiul în care mugurii florali sunt închiși de frunze și până în stadiul în care 30% din silicve au ajuns la dimensiunea finală (BBCH 50-73)	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Triticale de toamnă	**Septorioza** (Septoria tritici) **Rugina brună** (Puccinia recondita)	0,8l/ha	De la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69)	1	100-400 l/ha	Nu se aplică

ADAMA


Satu Mare
Maramureș
Sălaj
Bihor
Arad
Timiș
Caraș-Severin
Bistrița-
Năsăud
Cluj
Mureș
Alba
Hunedoara
Sibiu
Harghita
Brașov
Covasna
Suceava
Botoșani
Iași
Neamț
Bacău
Vaslui
Vrancea
Galați
Buzău
Prahova
Brăila
Tulcea
Ialomița
Călărași
Constanța
Gorj
Vâlcea
Argeș
Dâmbovița
Ilfov
București
Mehedinți
Dolj
Olt
Giurgiu
Teleorman

Adrian Sâmbotin
Director Comercial Național
0742 233 730

Raluca Rotaru
Director Vânzări Zonal Vest
0741 426 650

Adrian Colibaș
Reprezentant Tehnic
AR, TM, BH
0758 977 051

Ioan Fanu
Reprezentant Tehnic
TM, CS
0741 965 788

Sergiu Goina
Reprezentant Tehnic
SM, MM, SJ, BH
0737 522 420

Mădălina Parcea
Director Vânzări Zonal Sud
0762 456 176

Alexandru Coman
Reprezentant Tehnic
GR, IF, DB
0742 137 205

Ionuț Râbu
Reprezentant Tehnic
TR
0745 260 511

Petru-Florian Fecu-Tocea
Reprezentant Tehnic
DJ, GJ, MH
0766 524 525

Laurențiu Rusu
Director Vânzări Zonal Est
0731 494 679

Varol Islai
Reprezentant Tehnic
TL, CT
0751 232 166

Claudiu Vîrlan
Reprezentant Tehnic
VN, GL
0752 283 746

Tonița-Valentina Vizireanu
Reprezentant Tehnic
BR, TL
0755 097 445

Ionuț Crîșmaru
Reprezentant Tehnic
BC, VS
0741 113 177

Alina Folea
Reprezentant Tehnic
IL, CL
0741 227 526

Nicolae Butoianu
Reprezentant Tehnic
IL, CL
0751 136 503

Alin Marica
Reprezentant Tehnic
BZ, PH
0721 810 677

Nicolaie Budelecean
Director Vânzări Zonal Centru
0756 197 765

Robert Tîrșu
Reprezentant Tehnic
Ferme Mari
BT, IS, NT, SV
0756 154 126

Mihail Kocsis
Reprezentant Tehnic
MS, HR, SB, BV, CV
0724 599 578

Barna Torok
Reprezentant Tehnic
MS, HR, SB, BV, CV
0744 343 092

Diana Barticel
Reprezentant Tehnic
IS, NT
0743 285 367

ADAMA ROMÂNIA



ABSORBȚIE ȘI SISTEMIE

CREȘTE PERIOADA DE ACȚIUNE

TIMP REDUS DE ABSORBȚIE PÂNĂ LA PRIMA PLOAIE

1H

RENTABILITATE

SIMPLITATE ȘI ECONOMIE DE TIMP

ADAMA

POWERED BY

Asorbital®

FORMULATION TECHNOLOGY

ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS | P-ța Presei Libere, 3-5, etaj 12, City Gate Building North Tower, București, Sector 1 | Tel.: 021 212 13 61 | www.adama.com/romania/ro

PRODUSE PENTRU PROFESIONIȘTI: UTILIZAȚI PRODUSELE FITOSANITARE CU ATENȚIE. ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI ETICHETA ȘI INFORMAȚIA PRODUSULUI.