



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 513 от « 3 » февраля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

АДАМА АГРИКАЛЧАРАЛ СОЛЮШНС Лтд. (Израиль) (взамен ранее
выданного от 14 декабря 2012 г. № 2465)
(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Голтикс, КС (700 г/л метамитрона)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 281-03-513-1

на срок по «13» декабря 2022 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев


(подпись)



№ 000567



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата (л/га)	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность)
1	2	3	4	5
1,5-2	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных и первого листа у злаковых сорняков) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	58(2)
1,5			Опрыскивание посевов по всходам сорняков в смеси с 1,5 л/га гербицида Бельведер, СК (160 г/л десмедифама+160 г/л фенмедифама) или его аналогами (в фазе семядолей двудольных и первого листа у злаковых сорняков) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Срок безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; авиационным методом; в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

