



ADAMA

БАНДЖО® ФОРТЕ

Новый фунгицид
для защиты картофеля и лука
от комплекса заболеваний



Преимущества БАНДЖО® ФОРТЕ, КС:

- уникальная комбинация действующих веществ
- превосходная защита листьев и клубней картофеля от фитофтороза и альтернариоза, а также лука от перonosпороза
- длительный период защитного действия
- высокая дождеустойчивость
- эффективен против всех известных рас фитофтороза — превосходный инструмент антирезистентной стратегии





Препаративная форма: КС (концентрат суспензии)

Действующие вещества: диметоморф 200 г/л + флуазинам 200 г/л

Способ действия: локально-системный и контактный

Упаковка: канистра 5 л

Срок годности: 3 года

Культуры:

- картофель
- лук

Норма расхода препарата:


- 0,8–1,0 л/га

Спектр действия:

- фитофтороз
- альтернариоз
- пероноспороз



Контроль (без обработки)



Банджо® Форте в НР = 1,0 л/га
(4-хкратно за сезон)

Эффективность Банджо® Форте против комплекса болезней на картофеле, %

(по данным регистрационных испытаний, Ленинградская область, 2018)

Банджо® Форте НР = 1,0 л/га (4-хкратно)	Эффективность на ботве, %		Урожайность, т/га	Выход клубней по фракциям, %		
	фитофтороз	альтернариоз		товарный	семенной	н/с
	100	57,1	47,5	86,8	11,1	2,1
Контроль (без обработки)	Эффективность на ботве, %		Урожайность, т/га	Выход клубней по фракциям, %		
	фитофтороз	альтернариоз		товарный	семенной	н/с
	19,6	7,7	39,0	74,4	20,0	5,6



Регламенты применения

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, сроки обработки, особенности применения	Срок ожидания, дней (кратность обработок)
Картофель	0,8–1,0	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующие — интервалом 7–14 дней. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га	4 (4)
	0,8–1,0	Альтернариоз		
Лук	0,8–1,0	Пероноспороз		12 (4)

Факторы, определяющие эффективность

- Для обеспечения максимальной эффективности применяйте фунгицид БАНДЖО® ФОРТЕ профилактически, при наступлении условий, благоприятствующих развитию одного из заболеваний.
- Проводите опрыскивание в период вегетации при полном развитии листовой поверхности культурных растений.
- Интервал между обработками зависит от погодных условий, складывающихся в период вегетации, устойчивости сорта и норм расхода фунгицида БАНДЖО® ФОРТЕ. При эпифитотийном развитии заболеваний сокращайте интервал между обработками до 7 дней и используйте максимальные нормы расхода фунгицида.
- В условиях, неблагоприятных для развития заболеваний, применяйте фунгицид БАНДЖО® ФОРТЕ в минимальной норме расхода, при этом интервал между обработками может быть увеличен до 14 и более дней.
- Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности защищаемых культур. Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной листовой поверхности. При опрыскивании используйте форсунки, обеспечивающие средний и мелкий распыл капель рабочего раствора.

Ограничения

- Не проводите обработку, если растения покрыты росой или влажные после дождя — дождитесь высыхания листовой поверхности.
- Не проводите обработку, если культурные растения находятся в состоянии стресса.
- Не допускайте сноса распыла рабочего раствора фунгицида БАНДЖО® ФОРТЕ на соседние культуры.
- Не проводите обработку фунгицидом БАНДЖО® ФОРТЕ при температурах воздуха выше +25 °С и ниже +12 °С.
- Не используйте для приготовления рабочего раствора воду с температурой ниже +10° С.
- Проводите обработку ранним утром или поздним вечером при скорости ветра до 4–5 м/с. Погранично-защитная зона для пчёл — не менее 2–3 км, ограничение лёта пчёл от 3 до 24 часов.

Дождеустойчивость

Препарат устойчив к смыву через 30 минут после обработки.

Последующие культуры севооборота

Ограничений по чередованию культур в севообороте нет.



Совместимость в баковых смесях

Совместим в баковых смесях с другими препаратами компании ADAMA, применяемыми в те же сроки на зарегистрированных культурах. Внимательно читайте инструкции по применению, указанные в тарных этикетках препаратов, которые предполагается использовать в баковых смесях с фунгицидом БАНДЖО® ФОРТЕ, и строго им следуйте.

При применении фунгицида БАНДЖО® ФОРТЕ в баковых смесях с другими фунгицидами, микроудобрениями или активаторами рекомендуется провести их предварительное тестирование на совместимость с использованием небольших объемов компонентов баковой смеси и смешиванием в воде в отдельной ёмкости, прежде чем смешивать их в баке опрыскивателя.

Данные демонстрационных испытаний



Эффективность фунгицида Банджо® Форте в системе защиты картофеля при высоком инфекционном фоне



Контроль (без обработки)

Информация о продукте

