Пиринекс ® КЭ

ADAMA

Пиринекс ® КЭ

Универсальный фосфорорганический инсектоакарицид с широким спектром и фумигационным эффектом

Действующие вещества:	хлорпирифос 480 г/л
Химический класс действующих веществ:	ФОС
Препаративная форма:	концентрат эмульсии
Вредные объекты:	комплекс вредителей

Дополнительные свойства

- ✓ Предназначен для защиты большого количества культур от комплекса вредителей из различных классов: чешуекрылые (Lepidoptera), жесткокрылые (Coleoptera), двукрылые (Diptera), клопы (Heteroptera), равнокрылые (Homopterous), прямокрылые (Orthoptera), клещи (Acari)
- ✓ Сочетает высокую эффективность при низкихи при высоких температурах и длительное действие (от 14 до 28 дней).
- ✓ Фумигационная способность позволяет препарату работать в труднодоступных местах
- ✓ Препарат эффективно сдерживает клещей

Механизм действия

- ✓ Хлорпирифос – контактное вещество из класса фосфорорганических соединений.
- ✓ Обладает кишечным, контактным и фумигационным действием.
- ✓ Воздействует на активность ацетилхолинэстеразы, нарушает передачу нервных импульсов.

Пиринекс ® КЭ

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА
✓ За счет фумигантной способности быстро проникает в организм вредителя через систему дыхания в независимости открытоживущий это вредитель или живет скрытно.	✓ Быстрое действие
✓ Работа в труднодоступных местах благодаря фумигационному эффекту ✓ Дополнительная эффективность против клещей	✓ Высокая эффективность
✓ Широкий спектр эффективного применения ✓ Возможность использования как при прохладной, так и при жаркой погоде ✓ Широкий набор культур	✓ Универсальность применения

Применение: Сахарная свекла

Вредный объект: обыкновенный свекловичный долгоносик, совки, крошка, щитоноски

Норма расхода препарата: 2,0-2,5 л/га

Применение: опрыскивание в период вегетации

Срок ожидания: 30 дней

Максимальная кратность обработок: 2 раза

Расход рабочей жидкости: 200-400 л/га

Применение: Сахарная свекла

Вредный объект: листовая тля

Норма расхода препарата: 0,8 л/га

Применение: опрыскивание в период вегетации

Срок ожидания: 30 дней

Максимальная кратность обработок: 2 раза

Расход рабочей жидкости: 200-400 л/га

Применение: Сахарная свекла

Вредный объект: луговой мотылек, мертвоед

Норма расхода препарата: 1,5-2,0 л/га

Применение: опрыскивание в период вегетации

Срок ожидания: 30 дней

Максимальная кратность обработок: 2 раза

Расход рабочей жидкости: 200-400 л/га

Применение: Сахарная свекла

Вредный объект: блошка

Норма расхода препарата: 1,5 л/га

Применение: опрыскивание в период вегетации

Срок ожидания: 30 дней

Максимальная кратность обработок: 2 раза

Расход рабочей жидкости: 200-400 л/га

Применение: Яблоня

Вредный объект: плодожорка, листовертка, моль, клещ, щитовка, тля

Применение: опрыскивание в период вегетации

Норма расхода препарата: 2,0 л/га

Максимальная кратность обработок: 2 раза

Срок ожидания: 14 дней

Расход рабочей жидкости: 800-1500 л/га

Применение: Виноград

Вредный объект: гроздевая листовертка

Применение: опрыскивание в период вегетации 0,15%-м рабочим раствором против первого поколения вредителя

Норма расхода препарата: 1,2-1,8 л/га

Срок ожидания: 14 дней

Максимальная кратность обработок: 1 раз

Расход рабочей жидкости: 800-1200 л/га

Применение: Люцерна

Вредный объект: фитономус

Применение: опрыскивание в период вегетации

Норма расхода препарата: 1,5 л/га

Максимальная кратность обработок: 1 раз

Расход рабочей жидкости: 200-400 л/га

Применение: Пастбища, дикая растительность

Вредный объект: нестадные саранчовые

Применение: опрыскивание в период развития личинок

Норма расхода препарата: 0,5 л/га

Максимальная кратность обработок: 1 раз

Расход рабочей жидкости: 200-400 л/га

Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки

Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается

Рекомендации по применению

- ✓ Нижний температурный порог эффективного применения +8ºС
- ✓ Не применять в случае ожидаемых заморозков и сразу после них
- ✓ Дождь сразу после обработки снижает эффективность препарата
- ✓ Препарат токсичен для пчел

Ключевые преимущества



КОНТРАФАКТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ – ПОСТОЯННО РАСТУЩАЯ УГРОЗА!

Вы рискуете здоровьем ваших родных и близких, потерей урожая, а также наносите вред окружающей среде!

Покупайте
препараты только у официальных дистрибьюторов

Избегайте
сделок с неизвестными поставщиками

Проверяйте
упаковку препарата на предмет целостности и наличия элементов защиты

Требуйте
комплект документов с полным указанием всех деталей покупки

Если вы не уверены в оригинальности препаратов, обратитесь к своему поставщику или к региональным представителям компаний–производителей

ПРОСТО. РАСТЕМ. ВМЕСТЕ.

www.adama.com/russia

ADAMA