

Bromotril 25 SC

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na POST ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách, v obilninách s podsevom lucerny a v kukurici.



Silný a rýchly kontaktný účinok

Výhody použitia

- špecialista na durmany a lobody
- opravné riešenie na rezistentné buriny
- razantný a rýchly účinok

Pôsobenie prípravku

Bromotril 25 SC je selektívny kontaktný herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom. Jeho účinnosť je tým vyššia, čím je vyššia pokrývnosť listovej plochy pri ošetrení. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a neúčinkuje na semená burín. Buriny v čase aplikácie majú mať vyvinuté 2–4 pravé listy. Herbicídny účinok spočíva v narušení fotosyntézy citlivých burín. Účinok sa prejavuje do 24 hodín po aplikácii drobnými nekrotickými škvrnami.

Spektrum účinku

Citlivé buriny

Durman obyčajný, horčica roľná, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, láska-

vec ohnutý, lobody, ľuľok čierny, mak vlčí, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, rumančeky, stavikrv vtáčí, viky, výmrav slnečnice, žltica maloúborová.

Stredne citlivé buriny

Fialka roľná, hluchavky, hviezdica prostredná, lipkavec.

Termín aplikácie

Obilniny

Ošetríte od 2–4 listu do konca odnožovania.

Obilniny s podsevom lucerny

Ošetríte v dobe, keď podsev lucerny má vyvinutý aspoň 1 trojlístok a buriny majú 2–4 pravé listy.

Lucerna - odporúčací charakter

Lucernu v 2. a ďalšom roku ošetríte skoro na jar pred vyrašením v dávke 1-1,5 l/ha. Od 2. trojlístka lucerny

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE BURÍN V PORASTOCH S PODSEVOM.

Selektívny kontaktný herbicíd **Bromotril 25 SC** kontroluje rad dvojklíčnolistových burín. Výhodný partner do tank mixov v obilninách a kukurici. Samostatne odporúčame použiť na odburinenie lucerny.

Účinná látka:
250 g/l bromoxynil
Formulácia:
suspenzný koncentrát
Balenie:
20 l
Dávka vody:
300–400 l/ha

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1–1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1–1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel, Cliophar 300 SL
		1l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1l + (0,6 – 1l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC Starane 250 EC
obilniny s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny	1–1,5 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1 l - 1,3 l	60 dní	-
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1 - 1,25 l + (1 - 1,5 l)		(TM) Nicogan 40 OD

je možné navýšiť dávku prípravku na 1,5 - 2,0 l/ha.

pečiť dôkladnú pokrývnosť listovej plochy použitím min. 350 l/ha postrekovej kvapaliny s aplikáciou pri nízkom tlaku.

Kukurica

Aplikujte POST do výšky kukurice 20 cm. Neošetríte pri teplotách nad 25 °C. Pri výskyte jednoročných a trvácich tráv odporúčame TM s prípravkom Nicogan 40 OD. Na dosiahnutie spoľahlivého účinku proti burinám je potrebné zabez-



Riešenie prerastených burín v kukurici



Účinnok aplikácie prípravku Bromotril 25 SC v obilninách s podsevom lucerny