


Efica 960 EC

PRE a EPOST herbicídny špecialista určený na ničenie tráv a jedinečný TM partner s registráciou v mnohých plodinách.



Riešenie trávovitých burín nie je hlavolam

Výhody použitia

- známy svojim dlhým reziduálnym účinkom
- významný vedľajší účinok na niektoré problematické dvojkličnolistové buriny
- vynikajúca flexibilita aj na ľahších pôdach
- flexibilné dávkovanie sólo alebo v TM
- registrácia v mnohých plodinách: kukurica, slnečnica, repa, hrach, lupina, zemiaky, sója atď.

Pôsobenie prípravku

Efica 960 EC zasahuje buriny vo fáze klíčenia semien. Účinná látka **S-metolachlor** je prijímaná prostredníctvom koleoptylu, klíčkov a koreňov. Efica 960 EC je špecificky pôsobiaci herbicíd proti prosovitým trávam, predovšetkým ježatke kurej, mohárom, prstovkám, prosu atď. Jeho účinnosť proti dvojkličnolistovým burinám ako je láskavec ohnutý, zemedym lekársky, hviezdica prostredná a i. sa dá zvýšiť

v kombinácii so špecifickým prípravkom. Na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku je žiadúca dostatočná vlhkosť pôdy. Za sucha sa účinnosť prípravku znižuje, ale v porovnaní s inými prípravkami zo skupiny chloracetamidov je redukcia účinku podstatne slabšia.

Spektrum účinku

Citlivé buriny

ježatka kuria, metlička obyčajná, milota lipnicovitá, moháre, portulaka zeleninová, psiarka roľná, rumančeky, stoklasy, proso, prstovka krvavá, žltica malouborová.

Stredne citlivé buriny

cirok alepský zo semena, hviezdica prostredná, lesknice, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, láskavce, lipnice, mätonohy, ovos hluchý, veroniky, zemedym lekársky.

Účinná látka:

960 g/l s-metolachlor

Formulácia:

EC

Balenie:

5l

Dávka vody:

400–500 l/ha

Pri PRE aplikácii je možné miešať prípravok s kvapalným hnojivom DAM 390.

Náš tip:

- pre komplexné odburinenie kukurice:
EPOST: Nikita 0,4 kg + Efica 960 EC 1,2 l/ha
PRE, EPOST: Sulcotrek 1,75 – 2 l/ha + Efica 960 EC 1 l/ha
- pre komplexné odburinenie konvenčných porastov slnečnice a zemiakov:
Racer 2 l/ha + Efica 960 EC 1 l ha

BONUSOM NAVIAC

JE VÝZNAMNÁ VEDĽAJŠIA ÚČINNOSŤ NA DVOJKLÍČNOLISTOVÉ BURINY AKÝMI SÚ LÁSKAVCE, RUMANČEKY, HLUCHAVKY, ZEMEDYM A ĎALŠIE...

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1 - 1,25 l + (1,75 - 2 l)	AT	TM) Sulcotrek PRE, EPOST
		1,25 l + (1 l)	AT	(TM) Callisto 100 SC, PRE, EPOST
		1,2 l + 0,4 kg	AT	(TM) Nikita, EPOST
hrach, bôb	jednoročné tráv	0,8-1,4l	AT	-
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	1,4l + (0,2-0,25l)	AT	(TM) Command 36 CS
šošovica	jednoročné tráv	0,8-1,4l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,4l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	1,4l + (0,2-0,25l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	jednoročné tráv	0,8-1,4l	AT	
repa cukrová, repa krmna	ježatka, moháre	0,8-1,4l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4l + (4,1-4,9l)	AT	Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmravy repky	0,8-1,4l + (1 – 1,5l)	AT	(TM) Goltix Gold
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4l	AT	
repka ozimná	jednoročné tráv	1,6l	AT	

Odolné buriny

fialka roľná, horčičky, ľuľok čierny, mrlík biely, podsnežík Teofrastov, pohánkovce ovijavý, stavikrv vtáčí a trváce buriny.

Termín aplikácie

Aplikácia v kukurici

PRE a E-POST aplikácia prípravku Efica 960 EC ako aj ostatných pôdnych herbicídov zvyšuje dostatočnú pôdnu vlhkosť a kvalitne pripravená pôda bez hrúd.

Aplikácia v slnečnici

Prípravok Efica 960 EC je voči slnečnici vysoko selektívny aj na ľahkých pôdach. Na povrchu pôdy vytvára fotostabilný ochranný film. Na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku je žiadúca dostatočná vlhkosť pôdy. Pri pestovaní slnečnice v clearfieldových

technológiách odporúčame aplikáciu prípravku Efica 960 EC (PRE do 3 dní po sejbe slnečnice) v dávke 0,8 - 1,4 l/ha a následne POST aplikácia prípravku na báze účinnej látky imazamox.

Aplikácia v zemiakoch

Postrekujte po slepej preorávke a brázdení najneskôr však 3 dni pred vzídením zemiakov. Použite dávku vody 400 – 500 l/ha. Povrch pôdy musí byť dobre pripravený, bez hrúd.

Termíny aplikácie v rozličných technológiách:

- **Povrchová predsejbová aplikácia.** Iba pre minimálne spracovanie pôdy, alebo pre bezorebný systém. Prípravok Efica 960 EC možno aplikovať už 30

dni pred sejbou plodín.

- **Predsejbové spracovanie (PPI-systém) - Efica 960 EC** aplikujte a následne zapracujte plytko do pôdy, max. 5cm, pred sejbou za použitia brán, diskov, rotavátora prípadne iného vhodného zariadenia.
- **Preemergentne.** Aplikujte prípravok Efica 960 EC zároveň so sejbou alebo do 3 dní po sejbe, najneskôr však pred vzídením plodiny a burín. Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Povrch pôdy musí byť dobre pripravený, bez hrúd a pozbierových zvyškov.
- **Skorá postemergentná aplikácia.** Prípravok aplikujte v plných dávkach do rastovej fázy max. 1-2 listov trávovitých burín.