

# Mirage 45 EC

Širokospektrálny fungicíd s lokálne systémovým účinkom na ochranu obilnín proti chorobám päty stebiel, listov, klasov a na ochranu okrasných rastlín vo forme emulgovateľného koncentrátu s protektívnym a eradikatívnym účinkom.



Priamy zásah chorôb  
päty stebľa

## Výhody použitia

- ▶ lokálne systémový účinok
- ▶ široké spektrum účinku
- ▶ špecialista na listové škvrnitosti
- ▶ vhodný partner pre iné fungicídy na rozšírenie účinku a v rámci využívania antirezistentnej stratégie

## Pôsobenie prípravku

Mirage 45 EC je širokospektrálny fungicíd s lokálne systémovým účinkom, to znamená, že preniká do rastlinných pletív, avšak do neošetrených častí rastliny nie je rozvádzaný. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

## Spektrum účinku

Ničí široké spektrum hubových chorôb obilnín, komplex chorôb spôsobujúcich steblolam, septoriózy, múčnatku trávovú, komplex chorôb klasov, černe, alternáriovú škvrnitosť, fuzariózy, ryn-

chospóriovú škvrnitosť, hnedú škvrnitosť jačmeňa a ďalšie.

## Termín aplikácie

### Ozimné obilniny

#### Steblolam

Mirage 45 EC ničí R/W typy steblolamu vrátane izolátov rezistentných k benziimidazolovým fungicídmi. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom doteraz nebola zaznamenaná. Aplikujte pri prvých príznakoch, obvykle vo fáze BBCH 29-33.

### Pšenica – septoriózy

Ošetrte v rastovej fáze zástavového listu až do doby, kedy je úplne vyvinutý klas. Mirage 45 EC účinkuje aj na ďalšie choroby klasov, ako sú napr. černe a fuzárie.

### Účinná látka:

450 g/l prochloraz

### Formulácia:

emulgovateľný koncentrát

### Balenie:

5 l

### Dávka vody:

200–400 l/ha

Lokálne systémový fungicíd

**Mirage 45 EC** dlhodobodezinfikuje miesto dopadu účinnej látky bez jeho následného riedenia. V obilninách spoľahlivo kontroluje choroby päty stebiel vrátane obávaného R typu pravého steblolamu. Vykazuje vysokú aktivitu proti fuzariózam v klase. Znižuje obsah DON v zrne.

**OPORNÝ BOD V OCHRANE  
PROTI CHOROBÁM STEBIEL  
V OBILNINÁCH.**



## Odporúčenie pre aplikáciu

| Plodina                             | Škodlivý činiteľ                                                              | Dávka / ha          | OD | Poznámka             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------------|
| pšenica                             | stebloľam, septorióza pšenice                                                 | 1l                  | 42 |                      |
|                                     |                                                                               | 1l + ( 0,2 - 0,5l ) | 42 | (TM) Velocity        |
|                                     |                                                                               | 0,6 + (0,6l )       | 42 | TM Orius 25 EW**     |
| jačmeň                              | hnedá škvrnitosť,<br>rynchosporiová škvrnitosť                                | 1l                  | 42 |                      |
|                                     |                                                                               | 1l + ( 0,2 - 0,5l ) | 42 | (TM) Velocity        |
|                                     | hnedá škvrnitosť,<br>rynchosporiová škvrnitosť,<br>múčnatka, hrdze, fuzariózy | 0,6 + (0,6l )       | 42 | TM Orius 25 EW**     |
| jačmeň ozimný, raž,<br>triticale    | stebloľam, fuzariózy                                                          | 1l                  | 42 |                      |
|                                     |                                                                               | 1l + ( 0,2 - 0,5l ) | 42 | (TM) Velocity        |
| okrasné rastliny<br>(hlúzy, cibule) | fuzariózy                                                                     | 0,4%                | 42 | morenie hlúz a cibúl |

\*\* odporúčaná TM kombinácia

### Pšenica, jačmeň - múčnatka

Mirage 45 EC účinkuje na múčnatku preventívne. Po vzniku infekcie múčnatky je účinok nedostatočný!

### Jačmeň – listové škvrnitosti

Ošetríte v období výskytu uvedených chorôb, obvykle v priebehu steblovania až do kvetu, BBCH 30–61.


### Okrasné rastliny

Mirage 45 EC je vhodný na morenie hlúz a cibúl okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti fuzariózam. Morenie robte 15–20 min., pred výsadbou.

### Miešateľnosť

Mirage 45 EC je miešateľný s väčšinou bežne používaných herbicídov (vrátane fenoxykyselín), insekticídov, fungi-

cídov a s kvapalným hnojivom DAM 390. Do postrekovej kvapaliny zvlášť v období bohatom na dažde, pridajte 0,2–0,5 l/ha Velocity, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu, zníži úlet postreku a zaistí dlhodobjšie ochranné krytie.



Pre zvýšenie efektivity ošetrovania odporúčame pridať pomocnú látku **Velocity**.



stebloľam



bieloklasosť