

Nicogan 40 OD

Selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojkličnolistových burín v kukurici.



Ideálny partner
Sulcotrek a Pegas

Výhody použitia

- výborný účinok proti pýru plazivému a jednoročným trávovitým burinám
- účinný proti mnohým dvojkličnolistovým burinám
- TM s prípravkom Pegas rieši celé spektrum jedno a dvojkličnolistových burín
- možnosť aplikácie až do 8. listu kukurice

Pôsobenie prípravku

Prípravok Nicogan 40 OD účinkuje systémovo. Prijímaný je prostredníctvom listov a koreňov s rýchlou translokáciou do pletív, kde inhibuje delenie buniek a následne ďalší rast burín. Prvé príznaky účinku prípravku sa prejavujú už 1–2 týždne po aplikácii. Krátko po ošetrení buriny zastavujú rast, menia farbu a odumierajú. Prienik účinnej látky do rastliny je veľmi rýchly, dážď 2–4 hod. po aplikácii neznižuje jeho účinok.

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 1 l/ha

Fialka roľná, hluchavky, hviezdica prostredná, ježatka kuria, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, lipnica ročná, mlieč zeliný, mohár zelený, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, rumančeky, zemedym lekársky, ovos hluchý.

Stredne citlivé buriny v dávke 1 l/ha

Bažanka ročná, cirok alepský, lipkavec obyčajný, pýr plazivý.

Citlivé buriny v dávke 1,5 l/ha

Bažanka ročná, cirok alepský, čistec roľný, durman obyčajný, lipkavec obyčajný, pýr plazivý, proso spp.

Stredne citlivé buriny v dávke 1,5 l/ha

Ambrózia palinolistá, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovijavý, mrlík biely.

Účinná látka:
40 g/l nicosulfuron
Formulácia:
olejová disperzia
Balenie:
5 l
Dávka vody:
200–400 l/ha

Nicogan je herbicíd pre postemergentné ošetrovanie kukurice. Obsahuje rokmi osvedčenú účinnú látku nicosulfuron, ktorá je zo skupiny sulfonylmočovín najšetrnejšia ku kukurici. Predstavuje logického partnera pre prípravok Sulcotrek s ktorým spoločne ponúka kompletne riešenie burinného spektra kukuríc. Jednoducho. Spoľahlivo. Úsporne.

V TM S PRÍPRAVKOM
SULCOTREK RIEŠI KOMPLETNÉ
SPEKTRUM BURÍN V KUKURICI
VRÁTANE JEŽATKY, MOHÁROV,
CIROKU, PÝRU, LÁSKAVCOV,
MRLÍKOV.
DURMANU, PICHLIAČA,
PODSLNEČNÍKA, LIPKAVCA...
AJ ZA SUCHÝCH PODMIENOK.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
kukurica	jednoročné tráv, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trvác tráv, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC v štádiu 2-6. listov kukurice
		1-1,5 l + (0,6-0,8 l)		(TM) Pegas v štádiu 2-6. listov kukurice
	dvojkličnolistové buriny, jednoročné a trvác tráv	1 - 1,5 + (2 l)	AT	(TM) Sulcotrek

Termín aplikácie

Prípravok Nicogan 40 OD aplikujte v období aktívneho rastu burín v štádiu 2-8 listov kukurice (BBCH 12-18). Optimálny termín pre aplikáciu proti jednoročným trávovitým burinám je štádium 3-4 listov a proti dvojkličnolistovým burinám štádium 2-4 listov. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzrastených cca 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Cirok alepský (vzchádzajúci z podzemkov) je najcitlivejší pri výške cca 30 cm. Ideálnym TM partnerom pre Nicogan 40 OD je Pegas v dávke 0,6-0,8 l/ha, ktorý zabezpečí účinok na pichliač roľný, ambróziu palinolistú, lobody, stavikrv vtáčiu, ľuľok čierny a výrazne potláča pupenec roľný. Herbicídny účinok môže byť zoslabený v prípade, že Nicogan 40 OD aplikujete za chladného alebo dlhodobejšieho suchého počasia, či na zoslabený porast kukurice vplyvom nevhodných pôdných podmienok alebo zlou výživou. Ošetrovanie kukurice prípravkom Nicogan 40 OD odporúčame maximálne 1x za sezónu.

Upozornenie

Prípravok Nicogan 40 OD neaplikujte na porasty ošetrované listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických

zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu. Kvapalné listové hnojivá nie sú vhodné pre spoločnú aplikáciu s prípravkom Nicogan 40 OD. Ako následné plodiny môžu byť pestované: ozimné obilniny 4 mesiace po ošetrení, jarné obilniny 8 mesiacov po ošetrení, ostatné plodiny 10 mesiacov po ošetrení. Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd. Pre zlepšenie účinku v zhoršených poveternostných podmienkach (sucho, chlad, atď.) pridajte pomocnú látku **Rollwet**.



Dlhodobá účinnosť: TM Sulcotrek 2 l + Nicogan 40 OD 1 l/ha