

Pegas

Postrekový selektívny širokospektrálny kombinovaný herbicíd vo forme suspenznej emulzie určený pre postemergentné použitie proti odolným dvojkličnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici a semenných porastoch tráv.



Na krídlach prosperity

Výhody použitia

- spoľahlivé pôsobenie na dvojkličnolistové buriny vrátane rumančekov, lipkavca a pichliača
- možné TM s DAM 390
- výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami
- odolný voči zrážkam už 1 hod. po aplikácii
- nezanecháva v pôde reziduá – výsev následných plodín bez obmedzenia

Pôsobenie prípravku

Prípravok Pegas pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojkličnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. Buriny hynú zvyčajne v rozmedzí 14 - 21 dní po aplikácii. Prípravok

peniká do rastlín cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej syntézy (ALS) tým, že inaktivuje ALS enzým. Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.

Spektrum účinku

Citlivé buriny

Ambrózia palinolistá, čisteč roľný, durman obyčajný, hlaváček letný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, horčica roľná, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, mak vlčí, mlieč roľný, mrlík biely, ostrôžka poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, pichliač roľný, podsnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, redkev ohnicová, rumanček pravý, rumany, úhorník liečivý, vesnovka obyčajná, voškovník

Účinná látka:

6,25 g/l florasulam
300 g/l 2,4-D

Formulácia:

suspenzná emulzia

Balenie:

5 l

Dávka vody:

200-400 l/ha

Pegas je herbicíd do obilnín, kukurice a semenných porastov

tráv obsahujúci osvedčené účinné látky v plných dávkach. Predstavuje efektívne a cenovo výhodné riešenie kontroly veľmi širokého spektra dvojkličnolistových burín so širokým aplikačným oknom.

VYUŽITE

EFEKTÍVNY BALÍK NA KOMPLEXNÉ POSTEMERGENTNÉ NIČENIE BURÍN V KUKURICI

30 l NICOGAN 40 OD
+ 20 l PEGAS

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6l + (0,3l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná, pšenica jarná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6l + (60g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6l + (13g)	AT	(TM) Monitor 75WG
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5l + (0,3l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a iné trvácne buriny	0,6 - 0,8l	AT	
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a iné trvácne buriny, jednoročné a trvácne trávy	0,6 - 0,8l + (1 - 1,5l)	AT	NA Nicogan 40 OD POST Nicogan 40 OD
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6 - 0,8l	AT	

obyčajný, výmrav repky, výmrav slnečnice.

Stredne citlivé buriny

Fialky, hluchavky a veroniky

Termín aplikácie

Dvojkličnolistové buriny, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov.

Kukurica

Optimálny aplikačný termín prípravku Pegas je od vytvorenia 2. listu kukurice (BBCH 12) do vytvorenia 6. listu kukurice (BBCH 16). So zvyšujúcou sa rastovou fázou burín je potrebné zvyšovať aj aplikačnú dávku herbicidu (v intervale od 0,6 l/ha do 0,8 l/ha). V prípade výskytu trávovitých burín aplikujte prípravok Nicogan 40 OD v dávke 1 - 1,5 l/ha.

Upozornenie!

Neaplikujte pri teplote vyššej ako +25°C! Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

Následné a náhradné plodiny

Vďaka rýchlemu rozkladu tejto účinnej látky je prípravok Pegas veľmi bezpečný pre následné plodiny, vrátane veľmi citlivých plodín, ako sú repka, strukoviny a repa. V prípade, že je potrebné po aplikácii herbicidu Pegas ošetrovať obilninu zaorať, následne možno siať obilniny, kukuricu, sóju a slnečnicu.



Nicogan 40 OD 1l + Pegas 0,8 l/ha