

Tolurex 50 SC

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.



Nemrznúci pomocník

Výhody použitia

- široké aplikačné okno a spôsob použitia, na jeseň (PRE, POST) aj na jar
- dlhodobý účinok 6 - 8 týždňov
- aplikácia aj na zamrznutú pôdu

Pôsobenie prípravku

Tolurex 50 SC je prijímaný koreňmi aj listami rastlín a preto môže byť aplikovaný PRE aj POST.

Spektrum účinku

Hluchavky, hviezdica prostredná, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mlieč zelinný, mrlíky, parumančeky a rumany, peniažtek roľný, stavičky, metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná.

Termín aplikácie

V obilninách pripravok aplikujte na jeseň, alebo skoro na jar v dobe, keď má metlička 2 listy. Pri neskoršom použití účinok klesá. Tolurex 50 SC sa môže aplikovať aj na zamrznutú pôdu, nie však na snehovú pokrývku. Na dvojklíčnolistové buriny pôsobí v skorých rastových fázach, nepôsobí na lipkavec obyčajný. Ak je potrebné zaorať plochu ošetrovú Tolurexom 50 SC, nemôže byť následnou plodinou ovos, možno však vysiať jarný jačmeň alebo jarnú pšenicu.

TM s prípravkom Glean 75 WG aplikujte v čase, keď má lipkavec 1-2 praslery, metlička max. 1-2 listy a väčšina dvojklíčnolistových burín je už vzídená. Aplikáciu ukončíte do konca novembra. V prípade zaorania možno na tom istom pozemku a v tom istom roku vysievať ozimnú pšenicu alebo na jar jarný jačmeň alebo jarnú pšenicu.

Účinná látka:

500 g/l chlorotoluron

Formulácia:

suspenzný koncentrát

Balenie:

20 l

Dávka vody:

300-400 l/ha

Tolurex 50 SC kontroluje metličku

obyčajnú, hviezdicu prostrednú, hluchavky parumanček, rumany a i., buriny pri nízkych nákladoch. Osvedčený herbicíd široko použiteľný na jeseň i na jar do mnohých kombinácií.

TAM, KDE INÍ KONČIA,

TOLUREX ZAČÍNA

- HERBICÍDNA OCHRANA PRE NESKORÉ APLIKÁCIE.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná - jeseň	metlička, psiarka,	1,5-3 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3-2 l +(7 - 10g)	AT	(TM) Glean 75 WG*
		1,3-2 l +(18,5 - 37,5g)	AT	(TM) Logran 75 WG*
		1,5-2 l + (40 - 50g)	AT	(TM) Aurora 50 WG*
pšenica ozimná - jar	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l + (40 - 50 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG*
		1,5-3 l + (0,4 - 0,6 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-3 l	AT	(TM) Optica
		1,5-3 l +(0,8-1 l)	AT	(TM) Pendigan 330 EC
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 + (3 - 4 l)	AT	
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
triticale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

* odporúčací charakter

Upozornenie

Neaplikujte pri kľncovaní obilnín resp. v štádiu prvého listu hlavne za súčasného stresujúceho počasia napr. sucha.

Dávkovanie prípravku Tolurex 50 SC podľa rastovej fázy metličky:



1,3-1,5 l/ha
1 - 2 listy

2-2,5 l/ha
3 - 5 listov

3 l/ha
5 a viac



ošetrenie prípravkom Tolurex 50 SC aj pri nízkych teplotách, avšak nie na snehovú prikrývku