

# Tomigan 250 EC

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie odolných dvojkličnolistových burín v ozimných a jarných obilninách bez podsevom, kukurici, sadoch, zelenine, rasci, okrasných rastlinách, trávnikoch a v trávach na semeno.



Na lipkavec? Kedykoľvek!

### Výhody použitia

- špecialista na lipkavec v každej rastovej fáze
- použiteľný v mnohých plodinách
- vysoká selektivita v obilninách
- výborný TM partner

### Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku preniká do rastlín cez listy a je rýchle translokovaná cievnymi zväzkami. Účinok prípravku sa na citlivých burinách prejaví v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii typickými auxínovými príznakmi. Dážď 2 hodiny po aplikácii neovplyvní herbicídny účinok prípravku.

### Spektrum účinku

Lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, hluchavky, horčiaci, zemedym lekársky, prhlava

malá, starček roľný, pohánkovec ovíjavý, konopnica, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, nezábudka, štiavy, uhorník, durman obyčajný, skorocel kopijovitý, ľuľok čierny, pupenec roľný, púpava lekárska, výmrav slnečnice, prhlava dvojdomá. V TM s prípravkami na báze MCPA sa účinok rozširuje o mrlíky, lobodu konáristú, pichliač roľný, reďkev ohnicovú, horčicu roľnú. Dvojkličnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1-4 praslenu, parumanček nevoňavý je citlivý vo fáze malej ružice.

### Termín aplikácie

#### Obilniny bez podsevu

TOMIGAN 250 EC aplikujte od plného vyvinutia 2. listu do štádia vlajkového listu. Dvojkličnolistové buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-4 listov, lipkavec

VHODNÉ RIEŠENIE PRE  
OPRAVNÉ POSTREKY  
A VÝBORNÝ PARTNER DO TM  
ZMESÍ PRE ROZŠÍRENIE ICH  
ÚČINKU.



tri praslenu 0,3 l  
štyri praslenu 0,4 l  
päť praslenu 0,5 l  
šesť praslenu 0,6 l/ha

Dávkovanie prípravku Tomigan 250 EC  
v závislosti na počte praslenu lipkavca

#### Účinná látka:

250 g/l fluroxypyr

#### Formulácia:

emulgovateľný koncentrát

#### Balenie:

5 l

#### Dávka vody:

300-500 l/ha

### Odporúčenie pre aplikáciu

| Plodina                                                                          | Škodlivý činiteľ                   | Dávka / ha | OD     | Poznámka        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale | dvojkličnolistové buriny, lipkavec | 0,6-0,8 l  | AT     |                 |
| kukurica                                                                         | rumančeky, lipkavec                | 1 l        | AT     |                 |
| lúky a pasienky                                                                  | odolné dvojkličnolistové buriny    | 1 l        | 28 dní |                 |
| trávy                                                                            | odolné dvojkličnolistové buriny    | 1 l        | 3 dni  | semenné porasty |
| tulipán, narcis                                                                  | dvojkličnolistové buriny           | 0,8 l      | AT     |                 |

obyčajný vo fáze 1-8 praslenu, parumanček nevoňavý je citlivý vo fáze malej prízemnej ružice listov. Pri aplikácii musí byť na listoch obilniny vytvorená vosková vrstvička.

#### Kukurica

Tomigan 250 EC je špecialista na pupenec roľný a lipkavec obyčajný.

#### Rasca - odporúčací charakter

Do čistých výsevom i podsevom od 2. listu rasce, lipkavec do 4 praslenu.

#### Mak - odporúčací charakter

Aplikujte od 4-6 listov maku s dobre vytvorenou voskovou vrstvičkou. Použite najmä na pozemkoch s výskytom lipkavca.

#### Cibuľa - odporúčací charakter

Aplikujte od 2-3 listov cibule, najskôr 3-4 dni po daždi (je potrebné, aby sa vytvorila dokonalá vosková vrstvička na listoch).

#### Pažitka - odporúčací charakter

Aplikujte od 1. listu do kvitnutia v štádiu 2-4 listov burín, neošetríte pri teplotách nad 25°C.

#### Koreňová zelenina - odporúčací charakter

Od 2-3 listov mrkvy, minimálne pri 20 cm výške petržlenu či paštrnaku.

#### Lúky a pasienky

Pri rozvinutí veľkej listovej ružice štiavcov.

Trávy - semenné porasty - na novo založených porastoch ošetríte od fázy 4.



listov (BBCH 14), v nasledujúcich rokoch aplikujte na jar pri výške tráv 10-15 cm.

**Tulipán, narcis** - aplikujte pred kvetom a po odkvitnutí v období, kedy je lipkavec v rastovej fáze 1. praslenu a ostatné dvojkličnolistové buriny sú vo fáze 2-4 listov. Pri aplikácii musí byť na cibuľovinách vytvorená vosková vrstvička.