


Trimmer

Selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách.



Zbaví burín! Citlivo.

Výhody použitia

- systémový účinok s čiastočným krátkodobým príjmom aj koreňmi burín
- rýchle zastavenie rastu burín, pôsobenie aj pri nižších teplotách na vegetujúce buriny
- nízke aplikačné dávky, vysoká selektivita k ošetrovaným plodinám
- široký aplikačný interval a spektrum účinku
- výhodný TM partner, jednoduché dávkovanie

Pôsobenie prípravku

Trimmer je širokospektrálny systémový postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín v ozimnom a jarnom jačmeni, ozimnej a jarnej pšenici (vrátane pšenice špaldovej a tvrdej), raži, tritikale a ovse. Účinná látka patrí do skupiny sulfonylmočovín a je prijímaná prevažne listami, čiastočne aj koreňmi burín po dobu niekoľkých dní po aplikácii, bez negatívneho vplyvu rezíduí na následné plodiny. Prípravok zastavuje rast burín v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii, viditeľné príznaky (farebné zmeny, deformácie rastlín) na burinách sa objavujú cca 3 - 14 dní po aplikácii, podľa citlivosti burín a priebehu poveternostných podmienok. Pre lepší účinok v zhoršených aplikačných podmienkach (dlhšie obdobie sucha, vyššie teploty, silná vosková vrstvička na burinách) sa odporúča pridať adjuvant Rollwet. Pridanie kvapalných hnojív (DAM 390, SAM, roztok močoviny a pod.) taktiež podporuje lepší účinok prípravku, v tomto prípade pridanie adjuvantu nie je potrebné.

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 20 g/ha: Hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lýrovka obyčajná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, rumančeky, výmrvm repky a slnečnice.

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 20 g/ha:

Hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lýrovka obyčajná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, výmrvm repky a slnečnice.

VYUŽITE UŽITOČNÉ PARTNERSTVO DVOCH VYSOKO SELEKTÍVNYCH PRÍPRAVKOV NA OŠETRENIE 50 ha OBILNÍN 1,5 Kg TRIMMER + 20l TOMIGAN 250 EC.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	20 - 30 g	AT	TM s 0,4 - 0,6l Tomiganu 250 EC rozširuje účinnosť na lipkavec a ďalšie trvácne buriny.
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	20 - 30 g	AT	TM s 0,4 - 0,6l Tomiganu 250 EC rozširuje účinnosť na lipkavec a ďalšie trvácne buriny.
pšenica tvrdá, pšenica špaldová, raž, ovos, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	20 - 30 g	AT	TM s 0,4 - 0,6l Tomiganu 250 EC rozširuje účinnosť na lipkavec a ďalšie trvácne buriny.

Prípravok aplikujte len 1 x za sezónu.

Stredne citlivé buriny v dávke 20 g/ha:

Fialky, konopnica napuchnutá, mak vlčí, mrľík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, pichliač roľný, rumančeky.

Citlivé buriny v dávke 30 g/ha:

Hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lýrovka obyčajná, mrľík biely, nevädza poľná, nezábudka roľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, rumančeky, výmrvm repky a slnečnice.

Stredne citlivé buriny v dávke 30 g/ha:

Ambrózia palinolistá, fialky, mak vlčí, pichliač roľný, veroniky.

Termín aplikácie

Plodiny ošetríte POST, od 2. listu obilniny (BBCH 12) až do fázy objavenia zástavového listu (BBCH 39), optimálne do 2. kolienka obilniny (BBCH 32). Buriny by mali byť vo fáze 2 - 4 pravých listov, pichliač vo fáze listovej ružice až začiatku predĺžovacieho rastu. Na likvidáciu lipkavca použite kombinácie so špecifickým účinkom na lipkavec. Prípravok aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny, max. 1x za vegetáciu. V prípade aplikácie v TM overte aplikačné podmienky partnera.

Odporúčenie pre aplikáciu

Pri dodržaní odporúčaných dávok nevzniká riziko fytotoxicity. Zrážky dve hodiny po ošetrení prípravkom nemajú vplyv na jeho účinok, v prípade použitia kvapalných hnojív (napr. DAM 390, roztok močoviny a i.) alebo adjuvantu Rollwet sa táto doba skracuje. V prípade predčasnej likvidácie obilniny ošetrenej prípravkom Trimmer je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Po riadnom zbere obilniny je možné vysievať následné plodiny bez obmedzenia.



hviezdica, hluchavky, výmrvm repky



Účinná látka: 500 g/kg tribenuron-methyl
Formulácia: dispergovateľné granule
Balenie: 0,25 kg
Dávka vody: 250-400 l/ha

Osvedčená účinná látka šetrne chráni vaše obilniny. Široký aplikačný interval, spektrum účinku a výhodná formulácia poskytujú farmárovi dostatočný užívateľský komfort.



Názov buriny	Trimmer 20g/ha	Trimmer 30 g/ha	Trimmer 20 g/ha + Tomigan 25 EC 0,4 l/ha
Fialky	**	***	**
Hluchavky	***	***	***
Horčica roľná	***	***	***
Hviezdica prostredná	***	***	***
Kapsička pastierska	***	***	***
Konopnica napuchnutá	***	***	***
Lipkavec obyčajný	*	**	***
Mak vlčí	***	***	***
Mäta roľná	**	***	**
Mrlíky	***	***	***
Nevädza poľná	**(*)	**(*)	***(*)
Nezábudka roľná	***	***	***
Pakosty	**	***	**
Pichliač roľný	**(*)	***	**(*)
Pohánkovec ovíjavy	**	***	***
Pupenec roľný	*	*	***
Púpava lekárska	**	***	**
Redkev ohnicová	***	****	***
Repka výmrv	***	***	***
Ruman roľný	***	***	***
Rumančeky	***	***	***
Stavikrvy	**	***	***
Slnčnica výmrv	**	***	***
Starček obyčajný	**	***	**
Štiavce	**	***	***
Úhorník liečivý	***	***	***
Veronika brečtanolistá	*	*	**
Veronika perzská	**	**	**
Viky	***	***	***
Zemedym lekársky	**	***	**



pichliač roľný



rumančeky a rumany



veroniky

TRINITY

Využite synergiu unikátnej kombinácie troch účinných látok pre šetrné jesenné odburinenie vašich obilnín.



Trinity

v jednote je sila

3-zložkový
širokospektrálny jesenný
herbicíd na ošetrovanie
všetkých ozimných obilnín.



Výhody použitia

- Synergia unikátnej kombinácie troch účinných látok na našom trhu
- Tri rôzne mechanizmy účinku

- veľmi široké spektrum problematických jesenných a efemérnych burín spodného poschodia ako napr. pakosty, zemedym, veroniky, fialky, výmrv repky a slnečnice
- Riešenie rezistentnej metličky
- Jednoduché dávkovanie a použitie
 - miešateľnosť s insekticídmi, fungicídmi a listovými hnojivami, vr. roztoku močoviny, DAM 390 a SAM
 - dávka 2 l/ha optimálne vo fáze 1.–3. listu obilniny, max. do začiatku odnožovania BBCH 21
 - aplikácia pred vzídením až do 3 pravých listov burín
 - minimálne obmedzenia pre následné a náhradné plodiny

Využite spolupôsobenie troch účinných látok ktoré umožňuje jednu aplikáciu v dávke 2 l/ha zbaviť Vaše pole všetkých najdôležitejších širokolistových burín, vrátane rezistentných populácií metličky. Pôsobí dlhodobo, ľahko a jednoducho sa používa. Predstavuje novú kvalitu v prístupe k herbicídnej ochrane obilnín.

Účinné látky:
40 g/l diflufenican
300 g/l pendimethalin
250 g/l chlorotoluron

Formulácia: SC

Balenie: 5 l, 10 l

Dávka vody: 200–400 l/ha

ADAMA