

# Artemis

Kombinovaný širokospektrálny systémový fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) proti hubovým chorobám obilnín.



Stačí trafiť iba raz!

### Výhody použitia

- široký aplikačný interval a spektrum účinku
- systémový, lokálne-systémový a translaminárny pohyb účinných látok
- preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
- STOP-efekt na múčnatku a hrdze
- nízke riziko vzniku rezistencie – unikátna kombinácia 3 účinných látok vo vyváženom pomere
- výhodný TM partner, jednoduché použitie

### Pôsobenie prípravku

**Artemis** je kombinovaný širokospektrálny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinné látky prípravku patria do rôznych skupín (triazoly, imidazoly a morfolíny) s rôznym mechanizmom účinku, čo výrazne znižuje

riziko vzniku rezistencie patogénov. Systémovú zložku tvorí **tebuconazole**, ktorý je prijímaný listami a stonkami a transpiračným prúdom je rozvádzaný do celej rastliny. Lokálne – systémová zložka **prochloraz** preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín. Miesto ošetrenia účinne dezinfikuje. **Fenpropidin** je prijímaný listami a stonkami a systémovo sa rozvádza do celej rastliny transpiračným prúdom a translaminárnym pohybom.

### Spektrum účinku

**múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze** účinne pôsobi aj proti chorobám päty stebľa, DTR a klasovým chorobám\*

\*odporúčací charakter, v SR zatiaľ neregistrované.

### Účinná látka:

200 g/l prochloraz  
100 g/l tebuconazole  
150 g/l fenpropidin

### Formulácia:

emulgovateľný koncentrát

### Balenie:

5 l

### Dávka vody:

200–400 l/ha

Kombinovaný fungicíd v obľúbenej EC formulácii poskytuje ochranu proti celému spektru bežne sa vyskytujúcich hubových chorôb v obilninách. Výhodné riešenie pre obilniny s plánovaným jednorazovým fungicídnym ošetrením.

TRI ŠÍPY JEDNÝM VÝSTRELOM!  
VŠETKY CHOROBY NA JEDEN ZÁSAH!

Predaj do 30.6.2022  
Spotreba zásob u pestovateľa  
do 30.6.2023

### Odporúčenie pre aplikáciu

| Plodina                                          | Škodlivý činiteľ                                                              | Dávka / ha | OD     | Poznámka |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| pšenica ozimná,<br>pšenica jarná, raž, tritikale | múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza<br>pšenicová, **fuzariózy v klase | 1,5* - 2 l | 42 dní |          |

\* Prípravok v slovenských podmienkach poskytuje vynikajúcu úroveň ochrany už v dávke 1,5 l/ha,

\*\* Registrované v (UK), účinnosť a selektivita v SR testovaná v GEP pokusoch Doc. Ing. Kamil Hudec, 2017

### Termín aplikácie

Prípravok aplikujte max. 2 x za vegetáciu, od štádia začiatku predlžovacieho rastu do konca kvitnutia (BBCH 30 – 69), **optimálne v termíne T2**, v čase najvyššieho infekčného tlaku chorôb počas vegetácie (t.j. od 3.kolienka do obdobia, keď väčšina rastlín je už vyklasená (BBCH 33 – 57)). Použitie prípravku je vhodné pre **extenzívne výrobné podmienky s jedným fungicídnym ošetrením** počas vegetácie, **pre obilniny s krátkou vegetačnou dobou**, resp. **komerčne menej zaujímavé plodiny** (napr. tritikale, raž a i.). V prípade viacnásobnej aplikácie dodržte odstup medzi ošetreniami 21–28 dní.

### Odporúčenie pre aplikáciu

Pri dodržaní aplikačných podmienok prípravok nespôsobuje fytotoxicitu a nemá negatívny vplyv na úrodu a kvalitatívne parametre komodity. Pri použití v TM urobte skúšku miešateľnosti a overte si u výrobcu TM partnera prípadné obmedzenia.

Pre podmienky SR postačuje dávka 1,5 l/ha. Zloženie a spôsob účinku prípravku umožňuje jeho použitie odsunúť až do obdobia s podmienkami vhodnými pre infekciu. Pri uvažovanom viacnásobnom použití berte do úvahy obmedzenie použitia ú.l. tebuconazole na 500 g/ha raz za dva roky alebo 250 g/ha každoročne.

V nepriaznivom období pre zvýšenie rýchlosti príjmu a účinku odporúčame pridať pomocnú látku **Velocity** v dávke 0,2–0,5 l/ha, resp. v konc. 0,25%.



hrdza pšenicová




Využijete aj v období klasu



výborný STOP efekt na múčnatku

Účinnosť fungicídov proti fuzariózam v klase, pšenica ozimná 2017, Prof. Kamil Hudec, PhD.



optimálny termín aplikácie



excelentný v boji proti klasovým fuzáriám

Optimálne aplikujte pri prvých príznakoch napadnutia

Pšenica ozimná a jarná, raž, tritikale

Aplikačné okno: od fázy začiatku predlžovacieho rastu do konca kvitnutia (BBCH 30 – 69) pri prvých príznakoch choroby.

