

Gala 334 SL

Praxou preverený 2-zložkový systémový herbicíd na jesennú a jarnú EPOST a POST kontrolu širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v repke.



Zatočí s burinami elegantne, od jesene do jari

Výhody použitia

- ▶ osvedčené a rokmi preverené účinné látky
- ▶ flexibilné možnosti aplikácie na jeseň aj jar sólo alebo v TM
- ▶ kontroluje široké spektrum burín vrátane mrlíka, nevädze, rumančekov a rumanov, lipkavca, pichliača a mlieča
- ▶ rozširuje účinnosť Sultanu 50 SC v znížených dávkach
- ▶ účinkuje v širokom teplotnom rozmedzí + 8 °C až + 25°C

Pôsobenie prípravku

Gala 334 SL je herbicíd so systémovým pôsobením, do rastlín preniká prevažne povrchom listov a stoniek. Citlivé buriny krátko po zasiahnutí zastavujú svoj rast. Dochádza k deformáciám a farebným zmenám listov a stoniek burín. Buriny po aplikácii následne nekonkurujú plodine a postupne odumierajú. Prvé symptó-

my sú viditeľné 3-6 dní po aplikácii. Účinnok prípravku GALA 334 SL je za teplého, vlhkého počasia rýchlejší; pri nízkej teplote nastane úplné zničenie burín asi po 3 týždňoch. Prípravok účinkuje len na vzídené buriny, najúčinnnejšie ich ničí v štádiu 2-6 listov.

Spektrum účinku

Jarná aplikácia:

Buriny citlivé pre dávku prípravku 0,25 l/ha: nevädza poľná, zemedym lekárske, mrlík biely, pichliač roľný, parumanček nevoňavý, ruman roľný
Buriny stredne citlivé pre dávku prípravku 0,25 l/ha: bocianik rozpukovitý, hluchavka purpurová hviezdica prostredná, mlieč roľný, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovijavý
Buriny citlivé pre dávku prípravku 0,35 l/ha: nevädza poľná, zemedym lekárske, mrlík biely, mlieč roľný, pichliač

OBSAHUJE OVERENÉ ÚČINNÉ LÁTKY CLOPYRALID + PICLORAM V NAJNOVŠEJ FORMULÁCII NA TRHU. PRÍPRAVOK MÁ RÝCHLY NÁSTUP ÚČINKU.

Účinná látka:

267 g/l clopyralid
67 g/l picloram

Formulácia:

SL

Balenie:

5 l

Dávka vody:

200-300 l/ha.

Praktické možnosti aplikácie:

- **Jeseň:** EPOST aplikácia TM GALA 334 SL 0,2 l/ha + SULTAN 50 SC v dávke 1 – 1,5 l/ha
- **Jeseň:** PRE alebo EPOST aplikácia SULTAN 50 SC 1 – 1,5 l/ha + NA aplikácia TM vo fáze 3 – 4 listov GALA 334 SL v dávke 0,2 l/ha + graminicíd AGIL 100 EC resp. insekticíd DINASTIA
- **Na jar** v dávke 0,35 l/ha kontroluje aj prerastenejšie buriny do fázy viditeľného prvého internódia.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
repka ozimná repka jarná	lipkavec obyčajný	0,35 l	AT	na jar
	rumančekovité buriny, pichliač roľný, dvojklíčnolistové buriny	0,25-0,35 l	AT	na jar
repka ozimná	mrlík biely, ruman roľný	0,2 l	AT	na jeseň

roľný, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovijavý, parumanček nevoňavý, ruman roľný
Buriny stredne citlivé pre dávku prípravku 0,35 l/ha: hviezdica prostredná, bocianik rozpukovitý, hluchavka purpurová
Odolné buriny: kapsička pastierska, fialka roľná

Jesenná aplikácia:

Buriny citlivé pre dávku prípravku 0,2 l/ha: mrlík biely, ruman roľný
Buriny stredne citlivé pre dávku prípravku 0,2 l/ha: nevädza poľná
Odolné buriny: kapsička pastierska, fialka roľná

Pokyny pre aplikáciu

Rumančekovité buriny, lipkavec, mlieč roľný, pohánkovec ovijavý sú najcitlivejšie vo fáze 2-10 listov. Pichliač roľný vo fáze prízemnej ružice do 10 cm výšky rastlín. Mrlík biely je najcitlivejší do 5 cm výšky rastlín. Dbajte na rovnomernú aplikáciu.

Repka jarná a repka ozimná – jarná aplikácia: Prípravok používajte na jar od obnovenia aktívneho vegetačného rastu burín, aplikujte ho od fázy 9 listov po fázu viditeľného prvého internódia (BBCH 19-31) repky. Optimálny aplikačný termín je pri teplotách +10 °C až +25°C.

Odporúčame vyššiu dávku postrekovej kvapaliny. Postrek začína pôsobiť do 2 hodín po aplikácii. Dažďové zrážky po uplynutí tejto doby nenarušujú pôsobenie prípravku.

Upozornenie

Prípravok nepoužívajte, ak je porast mokrý, slabý, poškodený, ak je teplota vzduchu nižšia ako +8°C alebo vyššia ako +25°C, počas príliš suchého počasia, po celonočnom mraze a pred očakávaným mrazom. Maximálny počet aplikácií v repke jarnej za vegetačné obdobie: 1x

Repka ozimná - jesenná aplikácia:

Prípravok používajte na jeseň vo fáze 3-5 listov repky (BBCH 13-15). Maximálna jednorazová dávka je 0,2 l/ha. Maximálny počet aplikácií v repke ozimnej je použitie 1x za 3 roky.

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku musia byť buriny v štádiu aktívneho rastu pri priemerných denných teplotách 10 – 12 °C počas niekoľkých dní.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Náhradné plodiny: v prípade nutnosti zaorania repky ozimnej i repky jarnej

ošetrenej herbicídmi GALA 334 SL je možné, s odstupom 1 mesiaca po postreku, premiešani pôdneho profilu do hĺbky minimálne 10 cm a po predsejbovej príprave, vysievať na jar repku jarnú, horčicu, kukuricu, pšenicu jarnú, jačmeň jarný.

Ako následné plodiny po predchádzajúcom ošetrení prípravkom je možné pestovať obilniny, trávnaté porasty a kapustovité plodiny. Všetky plodiny možno pestovať s odstupom 24 mesiacov po ošetrení.



Ideálny TM partner