

Pirimor® 50 WG

Pirimor je selektívny insekticíd špeciálne vyvinutý proti všetkým druhom vošiek s rýchlym knock-down efektom.



Stále to vie každý tvor,
na vošky je Pirimor

Výhody použitia

- ▶ pôsobí kontaktne, požerovo aj ako dýchací jed
- ▶ v rastlinných pletivách sa translokuje a pôsobí hĺbkovo
- ▶ má fumigačný efekt, t.j. kontroluje aj vošky priamo nezasiiahnuté postrekom
- ▶ selektívne pôsobenie iba na vošky vrátane vlnačky krvavej
- ▶ dobre miešateľný s fungicídmi a listovými hnojivami
- ▶ registrovaný v integrovanej produkcii ovocia a zeleniny
- ▶ pri kontakte s pôdou sa rýchlo rozkladá bez rizika následných rezíduí v pôde
- ▶ registrovaný do 42 plodín

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku **pirimicarb** patrí medzi karbamátové zlúčeniny. Je selektívny, účinkuje ako dotykový a dýchací jed pôsobiaci ako inhibítor cholinesterázy. V rastlinných pletivách je rých-

lo translokovaný a pôsobí hĺbkovo. Po príjme pletivami je odolný proti zmytiu dažďom a UV stabilný. Prípravok Pirimor 50 WG aplikujte pri výskyte škodlivého činiteľa, resp. pri prekročení jeho prahu škodlivosti.

Odporúčané dávky vody

- kukurica, repka olejná, horčica, ďatelina, šalát, hlávková kapusta, tekvica, rajčiak, baklažán, kaleráb, melón, špenát, mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, šalotka, okružlica, cesnak, uhorka: 400 - 600 l/ha
- pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, fazuľa na zrno, bôb, hrach, repa cukrová, repa kýmna, repa červená, proso, cirok zemiak, lucerna: 300 - 400 l/ha
- pšenica tvrdá: 200 - 400 l/ha
- chren, hadomor španielsky: 200 - 600 l/ha

Účinná látka:
500 g/kg pirimicarb
Formulácia:
WG
Balenie:
1 kg
Dávka vody:
200 - 1000 l/ha

Pirimor je špecialista na vošky
v mnohých plodinách...

Pre zlepšenie účinku
prípravku odporúčame
pridať pomocnú látku
Rollwet.



MÁ KONTAKTNÝ, POŽEROVÝ ÚČINOK.
VĎAKA FUMIGAČNÉMU ÚČINKU
ÚSPEŠNE LIKVIDUJE AJ VOŠKY,
KTORÉ NIE SÚ POSTREKOM PRIAMO
ZASIAHNUTÉ. REGISTROVANÝ
V MNOHÝCH POĽNÝCH
A ZÁHRADNÝCH KULTÚRACH.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
kukurica	vošky	0,3-0,4 kg	AT	do BBCH 39
repka olejná, horčica	vošky	0,3-0,5 kg	AT	do BBCH 80
ďatelina	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos	vošky	0,15-0,26 kg	AT	do BBCH 85
fazuľa na zrno, bôb	vošky	0,3-0,5 kg	14	
hrach	voška hrachová	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová a repa kýmna	vošky	0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon
zemiak	vošky	0,3-0,5 kg	14	
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
slivka, čerešňa, broskyňa	vošky	0,05-0,075 %	7	
marhuľa	vošky	0,05 %	7	do BBCH 65
šalát	vošky	0,05-0,075 %	7	
		0,05-0,075 %	10	od 1.11 do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075 %	3	(skleník, fóliovník)
hlávková kapusta, špenát	vošky	0,05-0,075 %	3	
melón	vošky	0,05 %	3	(skleník, fóliovník)
rajčiak, baklažán, tekvica	vošky	0,05-0,075 %	3	(skleník, fóliovník)
kaleráb	vošky	0,05-0,075 %	7	
mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, cesnak	vošky	0,05-0,075 %	7	
uhorka	vošky	0,05-0,075 %	7	(skleník, fóliovník)
fenikel	vošky	0,3 kg	7	
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3-0,5 kg	14	
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075 %	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1 %	14	podľa TP

Viac informácií o registrácii v minoritných plodinách nájdete na str. 194

- mak, tabak, fenikel, hrach na struky, fazuľa na struky, suché strukoviny (na zrne), ľan, mäta pieporná, náprstník vlnatý: 300 – 600 l/ha

- slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, nektarinky, ringloty, drobné a bobuľové ovocie (ríbezľa, egreš, čučoriedka, josta a iné), malina, černica, jahoda, špargľa paprika, okrasné rastliny: 400 – 1000 l/ha

- lesné porasty: 300 l/ha

Pri aplikácii použite dostatočné množstvo vody, aby sa dosiahla dokonalá rovnomerná pokrývnosť, avšak nesmie dôjsť k odkvapkávaniu prípravku z povrchu ošetrovaných rastlín. Vyššie dávky vody sa odporúčajú pre ošetrovanie vyšších, hustejších porastov a porastov s veľkou plochou zelenej hmoty. Pre zlepšenie pokrývnosti postrekovej kvapaliny odporúčame pridať 0,1–0,4 l/ha zmáčadla Rollwet.

Upozornenie

Počet aplikácií počas vegetácie: max. 2x

Interval medzi aplikáciami:

- repka olejná, horčica, ďatelina, mak, lucerna, tabak, slivka, čerešňa, broskyňa, šalát, hlávková kapusta, kaleráb, špenát, mäta pieporná, náprstník vlnatý, okrasné rastliny, lesné porasty, paradajka, baklažán, kukurica, marhuľa, nektarinky, ringloty, jahoda, šalotka, hrach na struky, fazuľa na struky, ľan, proso, cirok, paprika, melón, tekvica, uhorka, fenikel: 7 dní

- drobné a bobuľové ovocie: 12 dní

- fazuľa na zrne, bôb, hrach, suché strukoviny (na zrne), zemiak, mrkva, petržlen, pastrnák, cibuľa, cesnak: 10 dní

- repa cukrová, repa krmná, repa červená, malina, černica, okrúhlica jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá raž, tritikale: 14 dní

- špargľa: 20 dní

Počas horúceho slnečného počasia rastliny prípravkom neošetrujte. Zvlášť v skleníkoch a za vysokých teplôt sa rastliny môžu poškodiť.

Prípravok pre včely škodlivý.

Aplikujte len v bezletovom čase včiel, vo večerných hodinách!

Aplikujte v bezveternom počasí; zabezpečte, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnuci porast! Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Episyrphus balteatus škodlivý!



voška maková na bôbe a larva lienky



voška maková na maku



minoritná registrácia: voška na ríbezliach



voška slamihová na slnečnici

REGULIS

Precízna a efektívna regulácia pre maximálnu úrodu.



REGULIS®

Stabilné základy vašej úrody



REGULÁTOR RASTU

Regulis® je rastový regulátor určený pre zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu, s overeným zložením.

Dávka: pšenica ozimná 0,5–1 l/ha
jačmeň: 0,75–1 l/ha

Účinná látka: 480 g/l ethephon

- Dynamický nástup účinku
- Možnosť cielej aplikácie v dobe aktuálnej potreby
- Zahusťuje zónu klasu
- Skrátenie a spevnenie produktívnych stebiel, rovnomerné dozrievanie porastu
- Pozitívny vplyv aplikácie na sladovnícke parametre kvality
- Optimálne využitie dusíka a ďalších živín
- Minimalizácia zberových strát
- Uľahčený zber
- Výhodné kombinácie s fungicidmi a regulátormi

Listen • Learn • Deliver

ADAMA.COM