

Sanvino

Originálny, kontaktný, fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.



Jedinečná 2 stupňová bariéra peronospóre

Výhody použitia

- ▶ nová účinná látka na slovenskom trhu
- ▶ dlhodobý preventívny účinok
- ▶ kuratívny účinok do 2 dní od nástupu infekcie
- ▶ rýchly prienik amisulbromu do pletív a jeho zabudovanie do voskovej vrstvy
- ▶ folpet navyše účinkuje proti bielej hnilobe viniča, červenej spále, čiernej škvrnitosti a plesni sivej
- ▶ možnosť použitia viackrát počas sezóny (až 4 x)
- ▶ široký aplikačný interval

Pôsobenie prípravku

Amisulbrom je kontaktná účinná látka s protektívnym aj kuratívnym účinkom (do 2 dní od začiatku infekcie). Po aplikácii rýchlo preniká do rastlinných pletív, kde vytvára zásobáreň účinnej látky vo voskovej vrstve, z ktorej sa postupne uvoľňuje. **Amisulbrom zasahuje do mitochondriálneho dýchania patogénov** z rodu

Oomycetes, t.j. rastlinných patogénov spôsobujúcich plesňové ochorenia. Pôsobí na viacerých úrovniach respiračného reťazca rôznych vývojových štádií patogéna, ako sú uvoľňovanie spór, klíčenie a pohyblivosť zoospór a rast mycélií. Folpet je širokospektrálna kontaktná účinná látka s preventívnym účinkom, potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Folpet inhibuje mnohé oxidačné enzýmy, ktoré sa podieľajú na metabolizme fosforu a syntéze citrátu. Zároveň je to nešpecifikovaný tiolový reaktant, inhibujúci respiráciu a delenie buniek patogéna. **Vďaka tejto nesystémovej viacbodovej inhibícii sa folpet využíva ako významný prvok antirezistentnej stratégie vo fungicídnych programoch.**

Miešateľnosť

Pre kompatibilitu zmesí je nevyhnuté sledovať inštrukcie TM partnera. Vždy

SANVINO® je možné aplikovať od začiatku vegetácie až do fázy vyfarbovania bobúľ. Účinné látky prípravku Sanvino sú charakterizované vysokou výkonnosťou a schopnosťou priľnúť k voskovej vrstve pletív. **Táto nová kombinácia umožňuje poskytnúť optimálnu ochranu vašim strapcom.**

Obsahuje unikátnu kombináciu účinných látok amisulbrom a folpet, ktorá poskytuje viacúrovňový, navzájom sa dopĺňajúci mechanizmus pôsobenia s preventívnym a kuratívnym účinkom.

Účinné látky:
50 g/kg amisulbrom
500 g/kg folpet
Formulácia:
WDG
Balenie:
5 kg
Dávka vody:
400 - 1600 l/ha

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
vinič	peronospóra viniča	0,375 - 1,5 kg	28	muštové hrozno

Dávkovanie: konc. 0,09375%

BBCH 14 (od 4.listu):
0,375 kg/ha v max. 400 l vody/ha

BBCH 61 (začiatok kvitnutia):
0,75 kg/ha v max.800 l vody/ha


BBCH 71 (nasadzovanie plodov):
1,12 kg/ha v max.1200 l vody/ha

BBCH 75 (bobule veľkosti hrášku):
1,5 kg/ha v max. 1600 l vody/ha

použite aplikačnú kvapalinu ihneď po jej príprave a so zapnutým zmiešavacím zariadením.



Sanvino je predurčené poskytnúť optimálnu ochranu vašich strapcov.



Ú.l. (amisulbrom + folpet) sú charakterizované vysokou výkonnosťou a schopnosťou priľnúť ku voskovej vrstve pletív. Táto nová kombinácia nám umožňuje poskytnúť optimálnu ochranu strapcov (bohatých na voskové látky).

Amisulbrom

- kontaktná účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom (do 2 dní od začiatku infekcie)
- rýchly prienik do pletív a zabudovanie do voskovej vrstvy, kde vytvára zásobáreň účinnej látky
- zasahuje do mitochondriálneho dýchania patogénov z r. Oomycetes – pôsobí na viacerých úrovniach respiračného reťazca rôznych vývojových štádií patogéna (uvoľňovanie spór, klíčenie a pohyblivosť zoospór, rast mycélia)

Folpet

- kontaktná účinná látka s preventívnym účinkom
- mnohostranné pôsobenie na patogéna – inhibuje mnohé oxidačné enzýmy (metabolizmus fosforu a syntéza citrátu)
- inhibuje respiráciu a delenie buniek patogéna, potláča rast mycélia a sporuláciu patogéna
- folpet navyše účinkuje proti bielej hnilobe viniča, červenej spále, čiernej škvrnitosti a plesni sivej


DVA ODLIŠNÉ MECHANIZMY ÚČINKU

AMISULBROM

Interferencia s mitochondriálnym respiračným reťazcom v komplexe cytochrómu BC, bod Qil

FOLPET

mnohostranné pôsobenie



Napadnutie listov viniča peronosporou



Prípravok **Sanvino** má vďaka folpetu významný vedľajší účinok na botrytídu.

SANVINO

S obsahom novej účinnej látky na slovenskom trhu proti peronospóre.



SANVINO®

2-stupňová bariéra peronospóre



FUNGICÍD

Originálny, kontaktný, fungicídny prípravok na ochranu viniča proti peronospóre viniča. Obsahuje unikátnu kombináciu účinných látok amisulbrom a folpet, ktorá poskytuje viacúrovňový, navzájom sa dopĺňajúci mechanizmus pôsobenia s preventívnym a kuratívnym účinkom. Sanvino® je predurčený na optimálnu ochranu strapcov.

Dávka: 0,375 – 1,5 kg/ha resp. konc. 0,09375 %

Účinné látky: 50 g/kg amisulbrom
500 g/kg folpet

Listen • Learn • Deliver

- Nová účinná látka na slovenskom trhu
- Dlhodobý preventívny účinok
- Kuratívny účinok do 2 dní od nástupu infekcie
- Rýchly prienik amisulbromu do pletív a jeho zabudovanie do voskovej vrstvy
- Folpet navyše účinkuje proti bielej hnilobe viniča, červenej spále, čiernej škvrnitosti a plesni sivej
- Možnosť použitia viackrát počas sezóny (až 4x)
- Povolný v integrovanej produkcii viniča

ADAMA.COM