

Tolurex 50 SC

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.



Nemrznúci pomocník

Výhody použitia

- široké aplikačné okno a spôsob použitia, na jeseň (PRE, POST) aj na jar
- dlhodobý účinok 6 - 8 týždňov
- aplikácia aj na zamrznutú pôdu

Pôsobenie prípravku

Tolurex 50 SC je prijímaný koreňmi aj listami rastlín a preto môže byť aplikovaný PRE aj POST.

Spektrum účinku

Hluchavky, hviezdica prostredná, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mlieč zelinný, mrlíky, parumančeky a rumany, peniažtek roľný, stavi-kry, metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná.

Termín aplikácie

V obilninách pripravok aplikujte na je-seň, alebo skoro na jar v dobe, keď má metlička maximálne 2 listy. Pri neskor-šom použití účinok klesá. Tolurex 50 SC sa môže aplikovať aj na zamrznutú pôdu, nie však na snehovú pokrývku. Na dvojklíčnolistové buriny pôsobí v skorých rastových fázach, nepôso-bí na lipkavec obyčajný. Ak je potrebné zaorať plochu ošetrovanú Tolurexom 50 SC, nemôže byť následnou plodinou ovos, možno však vysiať jarný jačmeň alebo jarnú pšenicu. Aplikáciu ukončíte do konca novembra. V prípade zaorania možno na tom istom pozemku a v tom istom roku vysievať ozimnú pšenicu alebo na jar jarný jač-meň alebo jarnú pšenicu.

Odporúčenie pre aplikáciu


Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná - jeseň	metlička, psiarka,	1,5-3l	AT	
		1,5-2l + (40 - 50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG*
pšenica ozimná - jar	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2l + (40 - 50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG*
		1,5-3l + (0,4 - 0,6l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-3l	AT	
		1,5-3l +(0,8-1l)	AT	(TM) Optica
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 + (3,3 - 4l)	AT	(TM) Pendigan
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3l	AT	
triticale	metlička	1,5-2,4l	AT	

* odporúčací charakter

Upozornenie

Neaplikujte pri kľncovaní obilnín resp. v štádiu prvého listu hlavne za súčasné-ho stresujúceho počasia napr. sucha.

Dávkovanie prípravku Tolurex 50 SC podľa rastovej fázy metličky:



ošetrenie prípravkom Tolurex 50 SC aj pri nízkych teplotách, avšak nie na snehovú prikrývku