

Tomigan 250 EC

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách bez podseвов, kukurici, sadoch, zelenine, rasci, okrasných rastlinách, trávnikoch a v trávach na semeno.



Na lipkavec? Kedykoľvek!

Výhody použitia

- špecialista na lipkavec v každej rastovej fáze
- použiteľný v mnohých plodinách
- vysoká selektivita v obilninách
- výborný TM partner

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku preniká do rastlín cez listy a je rýchle translokovaná cievnymi zväzkami. Účinok prípravku sa na citlivých burinách prejaví v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii typickými auxínovými príznakmi. Dážď 2 hodiny po aplikácii neovplyvní herbicídny účinok prípravku.

Spektrum účinku

Lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, hluchavky, horčiaci, zemedym lekársky, prhlava malá, starček roľný, pohánkovec oví-

javý, konopnica, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, nezábudka, štiavy, úhorník, durman obyčajný, skorocel kopijovitý, ľuľok čierny, pupenec roľný, púpava lekárska, výmrv slnečnice, prhlava dvojdomá. V TM s prípravkami na báze MCPA sa účinok rozširuje o mrlíky, lobodu konáristú, pichliač roľný, reďkev ohnicovú, horčicu roľnú.

Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1-4 praslénov, parumanček nevoňavý je citlivý vo fáze malej ružice.

Termín aplikácie Obilniny bez podsevu

TOMIGAN 250 EC aplikujte od plného vyvinutia 2. listu do štádia vlajkového listu. Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1-8 praslénov, paru-

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8l	AT	
kukurica	rumančeky, lipkavec	1l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1l	28 dní	
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1l	3 dni	semenné porasty
tulipán, narcis	dvojklíčnolistové buriny	0,8l	AT	

manček nevoňavý je citlivý vo fáze malej prízemnej ružice listov. Pri aplikácii musí byť na listoch obilniny vytvorená vosková vrstvička.

Kukurica

Tomigan 250 EC je špecialista na pupenec roľný a lipkavec obyčajný.

Rasca - odporúčací charakter

Do čistých výsevov i podsevov od 2. listu rasce, lipkavec do 4 praslénov.

Mak - odporúčací charakter

Aplikujte od 4-6 listov maku s dobre vytvorenou voskovou vrstvičkou. Použite najmä na pozemkoch s výskytom lipkavca.

Cibuľa - odporúčací charakter

Aplikujte od 2-3 listov cibule, najskôr 3-4 dni po daždi (je potrebné, aby sa vytvorila dokonalá vosková vrstvička na listoch).

Pažitka - odporúčací charakter

Aplikujte od 1. listu do kvitnutia v štádiu 2-4 listov burín, neošetríte pri teplotách nad 25°C.

Lúky a pasienky

Pri rozvinutí veľkej listovej ružice štiavcov.

Trávy - semenné porasty - na novo založených porastoch ošetríte od fázy 4. listov (BBCH 14), v nasledujúcich rokoch aplikujte na jar pri výške tráv 10-15 cm.

Tulipán, narcis - aplikujte pred kvetom a po odkvitnutí v období, kedy je lipkavec v rastovej fáze 1. praslenu a ostatné dvojklíčnolistové buriny sú vo fáze 2-4 listov. Pri aplikácii musí byť na cibuľovinách vytvorená vosková vrstvička.



Účinná látka:
250 g/l fluroxypyr
Formulácia:
emulgovateľný koncentrát
Balenie:
5 l
Dávka vody:
300-500 l/ha

Tomigan 250 EC účinkuje na rad dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca vo všetkých jeho rastových fázach. Mnohostranne použiteľný v mnohých plodinách.

VHODNÉ RIEŠENIE PRE
OPRAVNÉ POSTREKY
A VÝBORNÝ PARTNER DO TM
ZMESÍ PRE ROZŠÍRENIE ICH
ÚČINKU.

Dávkovanie prípravku Tomigan 250 EC
v závislosti na počte praslénov lipkavca

