

Twister

Systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na POST ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repe cukrovej a repe krmnej.



Ničí buriny v repe silou tornáda

Výhody použitia

- kombinácia dvoch najpoužívanějších účinných látok v repe
- výhoda listového a pôdneho účinku
- rýchly a razantný účinok,
- vhodný TM partner pre iné herbicídy
- najširšie spektrum účinku voči jedno-ročným dvojklíčnolistovým burinám,
- nízke riziko vzniku rezistencie cieľových druhov burín

Pôsobenie prípravku

Prípravok Twister je POST systémový herbicíd so širokým spektrom účinnosti. Spája v sebe kombináciu listového a pôdneho účinku. Účinná látka metami-tron inhibuje proces fotosyntézy, pôsobí hlavne cez korene, ale aj cez listy. Účinná látka ethofumesate inhibuje rast rastlín, pôsobí hlavne cez korene, ale aj cez listy. Pri viacnásobných aplikáciách a pri vyš-ších dávkach má ethofumesate dobrý reziduálny účinok na jednoročné tráv.

Twister je ideálny partner ku kontaktným prípravkom s účinnou phenmedipham, a triflusulfuron-methyl, lebo v TM výrazne predlžuje dobu herbicídneho účinku, čo oceníte najmä pri nepriaznivom počasí.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: Drchnička roľná, durman obyčajný, fialka roľná, hluchavka pur-purová, ježatka kuria, horčiak obyčajný, hviezdica prostredná, kapsička pastier-ska, lipkavec obyčajný, mrlík biely, mrlík hybridný, parumanček nevoňavý, žltica malouborová.

Stredne citlivé buriny: Laskavec ohnu-tý, veronika perzská, stavikrv vtáci, proso siate.

Termín aplikácie

Každá aplikácia (T1-T3) sa robí v rasto-vej fáze klíčnych listov až prvého listu burín (BBCH 10–11). Rastové štádium repy neobmedzuje použitie prípravku Twister, avšak orientačne by sa repa v čase aplikácie mala nachádzať v T1: BBCH 9–13, T2: BBCH 12–15 a T3: BBCH 14–21. Interval medzi aplikáciami priprav-ku Twister® by mal byť 7–14 dní. Twister

PESTOVATELIA ZAČÍNajú
OCEŇOVAŤ SYNERGICKÉ
PÔSOBNIE ÚČINNÝCH LÁTOK
METAMITRON A ETHOFUMESATE.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ -T ₃ : 1,5–2 l	AT	max. 3x za vegetáciu, max. dávka 6 l/ha/rok

by sa mal aplikovať 7 dní pred alebo po aplikáciách iných herbicídov s účinkom na širokolisté bu-riny alebo tráv. Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podpo-rujú účinok ethofumesátu, pôdna vlh-kosť zosilňuje účinok metamitronu.

Neaplikujte na stresované rastliny, rast-liny poškodené škodcami alebo mrazom. Neaplikujte na rastliny poškodené iný-mi herbicídmi. Neaplikujte pri teplotách vyšších ako 21°C.

TM s pôdnym zmáčadlom Grounded®



- zosilní a predĺži účinnosť,
- obmedzí nežiaduci úlet,
- zlepši pokrývnosť pôdy herbicídny filmom,
- zabráni splavovaniu herbicídu do neaktívnej zóny,

Overené komplexné riešenie:

- T1:** Twister® 1,5 l/ha
+ Kontakt® 320 SC 0,75 l/ha
+ triflusulfuron-methyl 30 g/ha
- T2:** Twister® 1,5 l/ha
+ Kontakt® 320 SC 1 l/ha
+ triflusulfuron-methyl 30 g/ha
- T3:** Twister® 2,0 l/ha
+ Kontakt® 320 SC 1 l/ha
+ triflusulfuron-methyl 30 g/ha



Twister - už žiadne letné zaburinenie

