


Agil 100 EC

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách, v lesnom hospodárstve a ovocných sadoch.



Najrýchlejšie pôsobiaci
graminicídi

Výhody použitia

- ▶ výborný účinok proti jednoročným aj trváčim trávovitým burinám
- ▶ nízke aplikačné dávky
- ▶ veľmi priaznivý pomer ceny a účinku prípravku
- ▶ najrýchlejší účinok medzi graminicídmi
- ▶ dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
- ▶ účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy

Pôsobenie prípravku

Agil 100 EC sa rýchlo vstreďáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj.

Agil 100 EC obsahuje zmáčadlo.

Spektrum účinku

Jednoróčné trávovité buriny:

Bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty, ježatka, jačmeň, lipnica, mätonoh, metlička obyčajná, ovos, psiarika roľná, prstovka krvavá, proso, stoklas.

Trváce trávovité buriny:

Cirok alepský, pýr plazivý, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, smľz kroviskový.

Termín aplikácie

Poľné plodiny

Agil 100 EC používajte ako postemergentný herbicíd a môžete ho aplikovať nezávisle od rastovej fázy plodiny. Aplikáciu robte na vzídené buriny, a to nasledovne:

- pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania, t.j. pri výš-

Účinná látka:

100 g/l propaquizafop

Formulácia:

emulgovateľný koncentrát

Balenie:

5 l

Dávka vody:

200–400 l/ha

Široká registrácia graminicídu

Agil 100 EC ponúka veľmi rýchlu a bezpečnú účinnosť proti trávovitým burinám v kombinácii s absolútnou selektivitou k pestovaným plodinám.

VYUŽITE AKCIU

50 l + 5 l za

1 €

AGIL 100 EC JE MIEŠATELNÝ

V TM S HERBICÍDMI AJ

V TECHNOLÓGII PESTOVANIA

SLNEČNICE EXPRESS SUN

V NOVÝCH HYBRIDOCH

SLNEČNICE. O KONKRÉTNÝCH

HYBRIDOCH SA INFORMUJTE

U DODÁVATEĽOV OSÍV.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
zemiak, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	30	
hrach	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	40	
ľan	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	110	
slnečnica, sója, mak	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	90	
repa cukrová, repa kýmna	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	45	
zemiak	pýr	1,2-1,5 l	30	
hrach	pýr	1,2-1,5 l	40	
ľan	pýr	1,2-1,5 l	110	
slnečnica, sója, mak	pýr	1,2-1,5 l	90	
repa cukrová, repa kýmna	pýr	1,2-1,5 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	pýr	1,2-1,5 l	45	
reпка ozimná	výmrav obilnín	0,4 l	90	skorá jeseň
	jednoročné tráv a výmrav obilnín	0,5-0,8 l	90	
	pýr	1,2-1,5 l	90	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce tráv	0,75-1,5 l	AT	
	smlz	2 l	AT	
jablňo, hruška	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	30 dní	
	pýr	1,2-1,5 l	30 dní	
broskyňa	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	30 dní	
	pýr	1,2-1,5 l	30 dní	
jahoda	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	35 dní	
	pýr	1,2-1,5 l	35 dní	
topoľ	jednoročné a trváce tráv	0,75-1,5 l	AT	
	smlz	2 l	AT	
cícer baraní	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	40 dní	
	pýr plazivý	1,2-1,5 l	40 dní	
špenát	jednoročné tráv, trváce tráv	0,8 l	30 dní	pre listový zber (mrazia-renská zrelosť)
špenát	pýr plazivý, trváce tráv	1,2 l	30 dní	pre listový zber (mrazia-renská zrelosť)
vinič	jednoročné tráv	0,75-1 l		
	trváce tráv, pýr plazivý	1-1,5 l		



neošetrená repka



neošetrená slnečnica

ke pýru cca 15 až 20 cm, širok alepský cca 30–40 cm.

- ježatka kuria, moháre, proso, metlička obyčajná a iné jednoročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania.
- výmrv obilnín – 0,4 l/ha v rastovej fáze plne vyvinutého 3. listu, pri plnom odnožovaní výmrvu 0,5 l/ha.

Pri postupnom vzhádzaní výmrvu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého počasia alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade odporúčame v prvej dávke aplikovať 0,35 l/ha v čase, keď má výmrv 1 - 2 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzídení ďalšej vlny výmrvu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla 2 až 3 týždne po prvej aplikácii.

Lesné hospodárstvo

Agil 100 EC možno použiť bez nebezpečenstva fytotoxicity po celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. Trávy ošetríte v rastovej fáze 2–3 pravých listov. Po postreku dodržte 3 týždne kultivačný pokoj.

Jabloň, hruška, broskyňa: Aplikácia pod korunami stromov, pri ošetrení nesmú byť zasiahnuté listy ošetrovaných stromov. Pri aplikácii používajte vhodné opa-

trenia na zmiernenie rizika (napr. použitie protiúletových trysiek, aplikácia s ochrannými štítmami).

Upozornenie

Na sóji, slnečnici alebo zemiakoch pri použití vyšších dávok herbicídu sa môžu na ošetrovaných listoch príležitostne vyskytnúť chlorotické škvrny. Tieto symptómy však rýchlo miznú a nemajú žiaden vplyv na ďalší rast, úrodu alebo kvalitu. Agil 100 EC je miešateľný s rôznymi fungicídmi, insekticídmi a herbicídmi. Pokiaľ je Agil 100 EC používaný v rámci postrekového sledu, musí byť dodržaný medzi aplikáciou iného herbicídu a Agil-u 100 EC interval najmenej 3 dni.



po aplikácii Agil 100 EC v repke



po aplikácii Agil 100 EC v slnečnici



výsledok v zemiakoch

Odporúčané dávkovanie graminicídu Agil 100 EC v závislosti od druhu a rastovej fázy trávovitých burín

pýr plazivý	1,0 l/ha	1,5 l/ha
výmrv obilnín	0,4 l/ha	0,5 l/ha
psiarka roľná	0,5 l/ha	1,0 l/ha
ovos hluchý	1,0 l/ha	1,2 l/ha
ježatka kuria	0,7 l/ha	1,0 l/ha

