

Legato 500 SC

Selektívny herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na preemergentné a postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.



Flexibilný TM partner

Výhody použitia

- ▶ kontaktný účinok a reziduálne pôsobenie
- ▶ účinok aj na rezistentné buriny spodného poschodia
- ▶ výhodný TM-partner
- ▶ široký aplikačný interval a spektrum účinku

prostredne po vzádení sa na nich prejavuje chloróza, ktorá sa rýchlo rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú. Pri PRE aplikácii vytvára Legato 500 SC na povrchu pôdy po aktivácii zrážkami tenký film, ktorý ničí klíčiace buriny. Pri POST aplikácii preniká do rastlín listami a hromadí sa v pletivách.

Pôsobenie prípravku

Legato 500 SC je selektívny herbicíd na PRE a POST aplikáciu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimnom jačmeni, ozimnej pšenici, raži a tritikale. Prípravok poskytuje kontaktnú aj reziduálnu účinnosť s dĺžkou trvania do 8 týždňov, za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok. Diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Účinná látka je prijímaná prostredníctvom hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a vegetatívnych rozmnzožovacích orgánov, sčasti koreňmi. Citlivé buriny klíčia, bez-

Spektrum účinku

Citlivé buriny pri sólo aplikácii

Fialka roľná, hviezdica prostredná, veroniky, stavikrv vtáčí.

Stredne citlivé buriny pri sólo aplikácii

Drchnička roľná, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovijavý.

Citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciach

Fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný, horčica roľná, hviezdica

Účinná látka:

500 g/l diflufenican

Formulácia:

suspenzný koncentrát

Balenie:

5 l

Dávka vody:

200–400 l/ha

Legato 500 SC poskytuje herbicídnu clonu proti problematickým jesenným a efemérnym burinám spodného poschodia, odolným voči prípravkom na báze sulfonylmočovín a ich derivátov. V TM s vhodnými partnermi, napr. prípravkami na báze chlorotoluronu, pendimethalinu rozširuje spektrum účinku na metličku obyčajnú a psiarku.

HĽADÁTE CENOVO VÝHODNÉHO TM PARTNERA PRE,

AURORU ČI TOLUREX?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE...

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činitel'	Dávka/ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, triticale ozimné	dvojklíčolistové buriny	0,2l	AT	základná herbicídna clona s možnosťou následnej herbicídnej aplikácie – odporúčací charakter
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticale ozimné	dvojklíčolistové buriny, metlička	0,2l + (1,5l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticale ozimné	dvojklíčolistové buriny, metlička	0,2l + (3,3l)	AT	TM 3,3-4,0 l/ha Pendigan; odporúčací charakter
pšenica ozimná	dvojklíčolistové buriny	0,2 + (40 - 50g)	AT	TM (40 - 50 g/ha Aurora 40 WG) – odporúčací charakter
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčolistové buriny, metlička	0,2l + (1,5l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčolistové buriny, metlička	0,2l + (3,3l)	AT	TM 3,3-4,0 l/ha Pendigan; odporúčací charakter

Prípravok aplikujte len 1x za sezónu.

prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, mak vlní, metlička obyčajná, mrlík biely, nevädza poľná, parumanček nevoňavý, penažtek roľný, psiarka roľná, úhorník liečivý, veroniky, výmrav repky olejnej, zemedym lekársky.

Stredne citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciách

Pohánkovec ovijavý, reďkev ohnicová, stavikrv vtáčí.

Termín aplikácie

Plodiny ošetrujte PRE (BBCH 00 - 09) alebo POST, od štátia vzchádzania do konca odnožovania (BBCH 09 – 29) obilniny. Prípravok aplikujte v skorej rastovej fáze cielových citlivých burín (BBCH 10 – 13), t.j. klíčnych listov až troch pravých listov. Najlepšiu účinnosť prípravku je možné dosiahnuť pri aplikácii na aktívne rastúce buriny v skorom rastovom štádiu na jeseň alebo skoro na jar. PRE ošetrenie sa odporúča na plochách s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Na ľahkých a kamenitých pôdach je lepšie prípravok aplikovať na jeseň POST. Pri POST aplikácii sa

neodporúča ošetrovať poškodené nedostatočne hlboko zasiate obilniny (hlbka aspoň 25 mm), prípadne porasty v zlom vegetačnom stave (stres, mráz, sucho, podmáčanie).

Odporučenie pre aplikáciu

Pri dodržaní odporúčaných dávok nevzniká riziko fytotoxicity. Neaplikujte v prípade, keď sa do 4 hodín po aplikácii očakávajú výdatnejšie zrázky. V prípade nutnosti likvidácie porastu v dôsledku zlého vzidenia alebo poškodenia, pôda ošetrená prípravkom Legato 500 SC na jeseň môže byť opäťovne osiata pšenicou ozimou priamo bez obmedzenia. Na jar po spracovaní pôdy do hlbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia. V normálnej rotácii plodín je možná seba po dôkladnej príprave pôdy bez obmedzenia. Neošetrujte porasty s podsevom ďatelinovín. Porast neodporúčame valcovať alebo brániť 15 dní pred alebo po POST ošetrení.



Riešenie proti rezistentným burinám spodného poschodia.