

# Tolurex 50 SC

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.



Nemrznúci pomocník

## Výhody použitia

- ▶ široké aplikačné okno a spôsob použitia, na jeseň (PRE, POST) aj na jar
- ▶ dlhodobý účinok 6 - 8 týždňov
- ▶ aplikácia aj na zamrznutú pôdu

## Pôsobenie prípravku

Tolurex 50 SC je prijímaný koreňmi aj listami rastlín a preto môže byť aplikovaný PRE aj POST.

## Spektrum účinku

Hluchavky, hviezdica prostredná, koleneč roľný, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mlieč zelinný, mrlíky, parumančeky a rumany, peniažtek roľný, stavikrky, metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná.

## Termín aplikácie

V obilninách pripravok aplikujte na jeseň, alebo skoro na jar v dobe, keď má metlička maximálne 2 listy. Pri neskoršom použití účinok klesá. Tolurex 50 SC sa môže aplikovať aj na zamrznutú pôdu, nie však na snehovú pokrývku. Na dvojklíčnolistové buriny pôsobí v skorých rastových fázach, nepôsobí na lipkavec obyčajný. Ak je potrebné zaorať plochu ošetrovanú Tolurexom 50 SC, nemôže byť následnou plodinou ovos, možno však vysiať jarný jačmeň alebo jarnú pšenicu.

Aplikáciu ukončíte do konca novembra. V prípade zaorania možno na tom istom pozemku a v tom istom roku vysievať ozimnú pšenicu alebo na jar jarný jačmeň alebo jarnú pšenicu.

### Účinná látka:

500 g/l chlorotoluron

### Formulácia:

suspenzný koncentrát

### Balenie:

20 l

### Dávka vody:

300–400 l/ha

**Tolurex 50 SC** kontroluje metličku

obyčajnú, hviezdicu prostrednú, hluchavky parumanček, rumany a i., buriny pri nízkych nákladoch. Osvedčený herbicíd široko použiteľný na jeseň i na jar do mnohých kombinácií.

**TAM, KDE INÍ KONČIA,**

**TOLUREX ZAČÍNA**

**- HERBICÍDNA OCHRANA PRE NESKORÉ APLIKÁCIE.**

## Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná - jeseň	metlička, psiarka,	1,5-3l	AT	
		1,5-2l + (40 - 50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG*
pšenica ozimná - jar	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2l + (40 - 50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG*
		1,5-3l + (0,4 - 0,6l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3l	AT	
		1,5-3l +(0,8-1l)	AT	(TM) Optica
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 + (3,3 - 4l)	AT	(TM) Pendigan
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3l	AT	
triticale	metlička	1,5-2,4l	AT	

\* odporúčací charakter

## Upozornenie

Neaplikujte pri klncovaní obilnín resp. v štádiu prvého listu hlavne za súčasného stresujúceho počasia napr. sucha.

### Dávkovanie prípravku Tolurex 50 SC podľa rastovej fázy metličky:



1,3-1,5 l/ha  
1 - 2 listy

2-2,5 l/ha  
3 - 5 listov

3 l/ha  
5 a viac



ošetrenie prípravkom Tolurex 50 SC  
aj pri nízkych teplotách,  
avšak nie na snehovú prikrývku