

Sultan TOP

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na preemergentnú a skorú postemergentnú kontrolu jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.



Top ochrana & bezpečnosť

Výhody použitia

Extra silná formulácia

- ▶ o 12 % metazachlóru /ha viac, ako ste boli zvyknutí
- ▶ o 50 % quinmeracu /ha viac, ako ste boli zvyknutí
- ▶ istejší účinok
- ▶ širokospektrálny účinok

Preemergentná + Postemergentná aplikácia

- ▶ predlžuje aplikačný interval až do 1. pravého listu burín
- ▶ vysoká dávka quinmeracu zvyšuje účinnosť na lipkavec aj bez vybielovania
- ▶ znižuje riziko neistých investícií, umožňuje precízne načasovanie postreku aj za nestáleho počasia
- ▶ flexibilné dávkovanie 1,75–2 l/ha
- ▶ prináša väčšiu variabilitu a jednoduchosť použitia

Pôsobenie prípravku

Prípravok Sultan Top je selektívny, PRE a EPOST herbicídny prípravok. Účinná látka metazachlór je absorbovaná predovšetkým hypokotylom a koreňmi klíčiacych rastlín, inhibuje bunkové delenie tým, že spomaľuje tvorbu dlhých reťazcov mastných kyselín. Účinná látka quinmerac je prijímaná predovšetkým koreňmi a z časti aj listami, čo vedie k deformáciám listov, inhibícii rastu koreňov a výhonkov. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Výsledkom je vybielenie, zožltnutie a skoré hynutie cieľových burín.

Spektrum účinku pri preemergentnej aplikácii (PRE)

Citlivé buriny

Hluchavky, veroniky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, rumančeky.

Účinná látka:

125 g/l quinmerac, 375 g/l metazachlór

Formulácia:

suspenzný koncentrát

Balenie:

5 l

Dávka vody:

100–400 l/ha

Herbicíd do repky s vyšším obsahom osvedčených účinných látok.

Poskytuje istejší účinok a flexibilnejšie dávkovanie ako ste boli zvyknutí.

Možnosť preemergentnej aj skoršej postemergentnej aplikácie znižuje riziko neistých investícií, umožňuje precízne načasovanie postreku aj za nestáleho počasia.

KOMPLEXNÝ, SELEKTÍVNY
HERBICÍD PRE DÔSLEDNÉ
ODBURINENIE REPKY OLEJNEJ.

PREDURČENÝ STAŤ SA
ZÁKLADNÝM KAMEŇOM
HERBICÍDNEJ OCHRANY REPKY.

Sultan Top - vývoj porastu po aplikácii



Sultan Top istý účinok bez rizika fytotoxicity pre ošetrenú repku.



Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka/ha	OD	Poznámka
repka ozimná	jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové buriny,	1,75 - 2 l	AT	PRE, EPOST 1 aplikácia raz za 3 roky na rovnakom pozemku

Na rovnakom pozemku môžete aplikovať v repke ozimnej max. 1000g metazachloru/ha raz za tri roky.

Stredne citlivé buriny

Ježatka kuria, láskavce, lipnica ročná, metlička obyčajná, mak vlčí, mrlík biely, psiarka roľná.

Spektrum účinku pri skorej postemergentnej aplikácii (EPOST)

Citlivé buriny

Hluchavky, hviezdička prostredná, ježatka kuria, láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lipnica ročná, mak vlčí, metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, rumančeky, veroniky.

Stredne citlivé buriny

Kapsička pastierska, mrlík biely, nevädza poľná, psiarka roľná, ruman roľný.

Termín aplikácie

Prípravok Sultan Top aplikujte preemergentne do 3 dní po sejbe pred vzídením repky a burín, alebo postemergentne po vzídení repky, pričom buriny by mali byť v štádiu klíčnych až 4 pravých listov (BBCH 10 – 14). Ošetrte plochy s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Nižšiu dávku prípravku použite na ľahších pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššiu dávku použite na stredne ťažkých a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnom výskyte burín, najmä lipkavca. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu. Prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov repky ozimnej sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ich ďalší rast a úrodu. Pre zvýšenie herbicídnej účinnos-


ti v suchých podmienkach aplikujte v TM s pôdnym zmáčadlom Grounded 0,3 l/ha.

Upozornenie

Pestovanie hlavných poľnohospodárskych plodín ako sú obilniny, cukrová repa, kukurica, hrach atď. ako následných plodín v normálnom osevnom slede po repke ozimnej ošetrenej prípravkom Sultan Top je možné bez obmedzenia.

V prípade potreby predčasnej zaorávky repky, môže byť bez obmedzenia znovu osiata repka ozimná. Ozimné obilniny môžu byť osiate najskôr 30 dní po aplikácii prípravku Sultan Top. Na jar môžu byť plodiny, ako sú obilniny, cukrová repa, kukurica a hrach a iné vysievané bez obmedzení.

Kedy a ako používať?



Účinnosť herbicídov v repke

Burina	Agil 100 EC	Glyfogan super	Sultan 50 SC	Sultan Top EPOST	Sultan Top PRE
lipkavec obyčajný	□	***	■	***	***
rumany, rumančeky	□	***	***	***	***
láskavce, mrlíky	□	***	***	**	***
veroniky, hluchavky	□	***	***	***	***
metlička obyčajná	***	***	□	**	***
výmrv obilnín	***	***	□	■	**
pýr plazivý	***	***	□	□	□

Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicidu AGIL 100 EC v dávke 0,5–0,8 l/ha.

Miešateľnosť: prípravok je miešateľný s graminicidom AGIL 100 EC, s insekticidom Dinastia a s DAM 390

Tento prospekt má len informatívny charakter.

Pri použití prípravkov sa riadte platnou etiketou a Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín.