

# Superfix



Dozrejú a neuniknú

Adjuvant určený pre obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej, hrachu, fazule, bôbu, ľanu, slnečnice a sóje.

## Výhody použitia

- ▶ obsahuje špecializovaný systém zmáčadiel
- ▶ bráni samovoľnému pukaniu a praskaniu šesúľ a strukov
- ▶ významne znižuje predzberové a zberové straty
- ▶ umožňuje prirodzené dozrievanie plodín
- ▶ zlepšuje kvalitatívne parametre semien
- ▶ možnosť použitia spolu s desikantmi
- ▶ biologicky ľahko odbúrateľný

## Pôsobenie prípravku

Vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú (semipermeabilnú) membránu, ktorá neobmedzuje vysychanie šesúľ a strukov, ale súčasne zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Takto zabraňuje samovoľnému praskaniu šesúľ a strukov pri dozrievaní,

resp. vypadávaniu semien pred zberom a počas zberu.

Superfix je možné použiť v TM kombinácii s desikantmi a s prípravkami na báze glyfosátu, vždy v súlade s etiketou použitého prípravku.

**Posledný termín aplikácie:** pred zberom plodiny (fáza plnej zrelosti).

**Maximálny počet ošetrení:** 1 x za sezónu v danej plodine

**Repka olejná:** aplikujte od fázy, kedy približne polovica šesúľ prešla zo zelenej na svetlo žltú farbu, čo je zvyčajne 3 - 4 týždne pred očakávaným zberom. Šesule sú v tomto čase ešte pružné a je možné ich medzi prstami ohnúť do tvaru písmena U.

### Účinná látka:

420 g/l karboxylový styrén  
butadién kopolymér

### Formulácia:

SL

### Balenie:

5 l

### Dávka vody:

150 - 300 l/ha

Superfix je pomocný prípravok určený pre obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej, slnečnice, sóje, strukovín atď.

KOMBINÁCIA VHODNEJ ODRODY  
+ SUPERFIX PRINÁŠA NAJLEPŠIE  
VÝSLEDKY.

## Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
repka olejná, hrach, fazuľa, bôb, ľan, slnečnica, sója	obmedzenie strát pri zbere	0,8* - 1 l	AT	

\* pri menej hustom poraste možno znížiť dávku

**Hrach:** aplikujte v čase, kedy vlhkosť semien dosahuje cca 40 - 50%, struky sú ešte pružné, ale semená už získavajú nahorklú chuť.

**Slnečnica:** aplikujte v čase, kedy je vlhkosť nažiek v rozmedzí 25–30 %, približne 14 dní pred zberom.

**Sója:** aplikujte 3 až 4 týždne pred zberom. V prípade silného zaburinenia, resp. potreby harmonizácie dozrievania nerovnomer-

ných porastov je možná aj TM kombinácia s **Glyfoganom Super**, resp. desikantmi.


Po aplikácii nádrž, čerpadlo a hadice prepláchnite ne-iónovým čistiacim prostriedkom.



Správny termín pre aplikáciu adjuvantu Superfix

## SUPERFIX, dozrejú a neuniknú

Eurofins UK 2018



- Nepukavá odroda Dekalb DK Extrovert
- Termín aplikácie: BBCH 80, bez použitia desikantu

- Eurofins UK 2018
- GLP pokus

## Neošetrené šesule v priebehu dozrievania pukajú



**SuperFix** vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú vrstvu, ktorá neobmedzuje vysychanie šesúl a strukov, ale súčasne zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Šípky označujú smer tlaku, ktorý vzniká behom vysychania šesule.