

# Tomigan 250 EC

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie odolných dvojkličnolistových burín v ozimných a jarných obilninách bez podsevo, kukurici, sadoch, zelenine, rasci, okrasných rastlinách, trávnikoch a v trávach na semeno.



Na lipkavec? Kedykoľvek!

## Výhody použitia

- ▶ špecialista na lipkavec v každej rastovej fáze
- ▶ použiteľný v mnohých plodinách
- ▶ vysoká selektivita v obilninách
- ▶ výborný TM partner

## Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku preniká do rastlín cez listy a je rýchle translokovaná cievnymi zväzkami. Účinok prípravku sa na citlivých burinách prejaví v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii typickými auxinovými príznakmi. Dážď 2 hodiny po aplikácii neovplyvní herbicídny účinok prípravku.

## Spektrum účinku

Lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, hluchavky, horčičky, zemedym lekárske, prhlava malá, starček roľný, pohánkovec oví-

javý, konopnica, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, nezábudka, štiavy, úhorník, durman obyčajný, skorocel kopijovitý, ľuľok čierny, pupenec roľný, púpava lekárska, výmrav slnečnice, prhlava dvojdomá. V TM s prípravkami na báze MCPA sa účinok rozširuje o mrlíky, lobodu konárístú, pichliač roľný, reďkev ohnicovú, horčicu roľnú.

Dvojkličnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2–4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1–4 praslénov, parumanček nevoňavý je citlivý vo fáze malej ružice.

## Termín aplikácie

### Obilniny bez podsevu

TOMIGAN 250 EC aplikujte od plného vyvinutia 2. listu do štádia vlajkového listu. Dvojkličnolistové buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2–4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1–8 praslénov, paru-

### Účinná látka:

250 g/l fluroxypyr

### Formulácia:

emulgovateľný koncentrát

### Balenie:

5 l

### Dávka vody:

300–500 l/ha

Tomigan 250 EC účinkuje na rad dvojkličnolistových burín vrátane lipkavca vo všetkých jeho rastových fázach. Mnohostranne použiteľný v mnohých plodinách.

VHODNÉ RIEŠENIE PRE  
OPRÁVNÉ POSTREKY  
A VÝBORNÝ PARTNER DO TM  
ZMESÍ PRE ROZŠÍRENIE ICH  
ÚČINKU.

Dávkovanie prípravku Tomigan 250 EC  
v závislosti na počte praslénov lipkavca



tri praslény 0,3 l    štyri praslény 0,4 l    päť praslénov 0,5 l    šesť praslénov 0,6 l/ha

## Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8l	AT	
kukurica	rumančeky, lipkavec	1l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1l	28 dní	
trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	1l	3 dni	semenné porasty
tulipán, narcis	dvojkličnolistové buriny	0,8l	AT	

manček nevoňavý je citlivý vo fáze malej prízemnej ružice listov. Pri aplikácii musí byť na listoch obilniny vytvorená vosková vrstvička.

### Kukurica

Tomigan 250 EC je špecialista na púpeneč roľný a lipkavec obyčajný.

### Rasca - odporúčací charakter

Do čistých výsevov i podsevov od 2. listu rasce, lipkavec do 4 praslenuv.

### Mak - odporúčací charakter

Aplikujte od 4-6 listov maku s dobre vytvorenou voskovou vrstvičkou. Použite najmä na pozemkoch s výskytom lipkavca.

### Cibuľa - odporúčací charakter

Aplikujte od 2-3 listov cibule, najskôr 3-4 dni po daždi (je potrebné, aby sa vytvorila dokonalá vosková vrstvička na listoch).

### Pažitka - odporúčací charakter

Aplikujte od 1. listu do kvitnutia v štádiu 2-4 listov burín, neošetrujte pri teplotách nad 25°C.

### Lúky a pasienky

Pri rozvinutí veľkej listovej ružice štiavcov.

**Trávy** - semenné porasty - na novo založených porastoch ošetrujte od fázy 4. listov (BBCH 14), v nasledujúcich rokoch aplikujte na jar pri výške tráv 10-15 cm.

**Tulipán, narcis** - aplikujte pred kvetom a po odkvitnutí v období, kedy je lipkavec v rastovej fáze 1. praslenu a ostatné dvojkličnolistové buriny sú vo fáze 2-4 listov. Pri aplikácii musí byť na cibuľovinách vytvorená vosková vrstvička.

Využite užitočný balík v zložení:

**1 kg Trimmer + 20 l Tomigan 250 EC**  
na ošetrovanie 50 ha jarných a ozimných obilnín

