

Systémový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu repky olejnej, slnečnice a obilnín proti hubovým chorobám.



Zvýšte kontrolu chorôb

Výhody použitia

- ▶ silná kombinácia účinných látok Prothioconazole + Azoxystrobin
- ▶ obilniny: ekonomický širokospektrálny zásah vrátane septórií, hrdzí a DTR na T1-T2 ošetrovanie. Zvyšuje výnos a HTZ
- ▶ repka: T3 aplikácia proti bielej hnilobe a černiam
- ▶ zvyšuje výnos a olejnatosť semien
- ▶ slnečnica: T2 ošetrovanie proti bielej hnilobe a černej slnečnicovej
- ▶ „Ready-mix“ - Jednoduchosť, univerzálnosť a flexibilita použitia

Pôsobenie prípravku

Prípravok MAXENTIS obsahuje dve systémove pôsobiace účinné látky prothioconazole a azoxystrobin.

Prothioconazole preniká po aplikácii veľmi rýchlo do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postre-

kom. Prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolinthionov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových membrán. Pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Azoxystrobin je účinná látka s translačným pôsobením, zastavuje elektronový transport pri dýchaní mitochondrií patogénnych húb. Účinok je predovšetkým preventívny a preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin poskytuje dlhé reziduálne pôsobenie, môže zabrániť vzniku novej infekcie po dobu 3 – 8 týždňov. Účinkom azoxystrobinu sú porasty dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšie tvoriť a následne ukladať

Účinná látka:

Prothioconazole 150 g/l

Azoxystrobin 200 g/l

Formulácia:

SC

Balenia:

5 l

Dávka vody:

100 – 400 l/ha

URČENÉ PRE PESTOVATEĽOV OBIĽNÍN A REPKY. MAXENTIS JE NOVÝ ŠIROKOSPEKTRÁLNY FUNGICÍD V READY-MIX FORMULÁCII, KTORÝ V OBIĽNINÁCH ZAIŠTÍ SPOĽAHLIVÚ KONTROLU MNOHÝCH LISTOVÝCH CHORÔB VRÁTANE SEPTORIÓZ, HRDZÍ A DTR. V REPKE ZAIŠTÍ EXCELENTNÚ ÚČINNOSŤ PROTI BIELEJ HNILOBE A ČERNIAM. NAVIAC ZVÝŠI ÚRODU VĎAKA SVOJIM FYZIOLOGICKÝM EFEKTOM.

NOVÝ ŠIROKOSPEKTRÁLNY FUNGICÍD REGISTROVANÝ V OBIĽNINÁCH, REPKE A V SLNEČNICI S OBSAHOM ÚČINNÝCH LÁTKO AZOXYSTROBIN A PROTHIOCONAZOLE.



Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka /ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, tritikale, raž jarná, raž ozimná	septorióza pšenice, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy, helmintosporiáza pšenice (DTR), múčnatka trávová	0,8 - 1,0 l	35 dní	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,8 - 1,0 l	35 dní	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, čerň repková	0,8 - 1,0 l	42 dní	
slnečnica	biela hniloba, čerň slnečnicová	0,8 - 1,0 l	35 dní	

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

asimiláty do semien a bobúľ. Výsledkom je nielen vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zberaného produktu.

Termín aplikácie

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu. Prípravok aplikujte v nižšej dávke z autorizovaného rozsahu iba pri nižšom infekčnom tlaku škodlivého organizmu.

Pšenica ozimná, pšenica jarná, tritikale:

Proti listovým chorobám ošetríte na začiatku napadnutia v termíne od začiatku predlžovania stebľa do konca kvitnutia (BBCH 30-69).

Raž ozimná, raž jarná:

Ošetrovanie závisí od prvého výskytu a infekčného tlaku. Ošetríte od rastovej fázy začiatku predlžovania stebľa do fázy plného kvitnutia (BBCH 30-65).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:

Ošetrovanie závisí od prvého výskytu a infekčného tlaku. Ošetríte od rastovej fázy začiatku predlžovania stebľa do fázy plného kvitnutia (BBCH 30-65).

Repka ozimná, repka jarná:

Ošetrovanie závisí od prvého výskytu a infekčného tlaku. Proti bielej hnilobe ošetríte repku od rastovej fázy prítomných kvetných pupeňov do konca kvitnutia (BBCH 50-69). Proti černej repkovej ošetríte od rastovej fázy plného kvitnutia do rastovej fázy kedy 30% šesúľ dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 65-73).

Slnečnica:

Ošetríte od rastovej fázy začiatku predlžovania byle do konca kvitnutia slnečnice (BBCH30-69). Okvetné lístky slnečnice ošetrované prípravkom na ochranu rastlín MAXENTIS sa nesmú použiť na výrobu bylinných nálevov a ani na iné konzumné a krmné účely!

Aké zmáčadlo najlepšie zvoliť?

Ak chcete ešte zvýrazniť účinnosť prípravku, vždy pomôže správna voľba a dávka špeciálneho adjuvantu-zmäčadla. Ale je tu plodinový rozdiel:

Obilniny: Tank Mix s **Velocity®** Všeobecne odporúčame pridávať k fungicídom, a to na ich listové aplikácie (teda T1 & T2, nie však T3) akcelerátor systémických fungicídom **Velocity®**. Najčastejšie

v dávke 0,25 l/ha, ktorá pomôže aktívne a rýchlo vtiahnuť účinné látky do rastlinných pletív. Tým sa podporí celkovo vyššia aj dlhodobejšia účinnosť zásahu.

Repka: Tank Mix s **Rollwet®**

Pri aplikáciách do kvitnúcej repky ale volíme zmenu. Lebo prioritou pri tomto zásahu je čo najlepšie roztrhnúť pokrývnosť aplikačnú kvapalinu na, v tom čase ktoré mohutný, porast rastlín. Tu sa výborne uplatňuje Rollwet a dávujeme ho v súlade s volenou dávkou vody. Na 400 l vody stačí aj 0,05 l/ha, ak musíme na 100 l vody/ha, potom je dávka 0,2 l/ha, na 200-300 l vody/ha potom 0,1 l/ha.