

Nová formulácia



Pegas Cereal

Na krídlach
prosperity



**Širokospektrálny
kombinovaný herbicíd
na postemergentné
ničenie odolných
dvojkličnolistových
burín v obilninách
bez podsevu.**

Účinné látky:
2,4 D 300 g/l,
florasulam 6,25 g/l
Formulácia: SE
Balenie: 5 L

Výhody použitia:

- najlepší pomer ceny a účinku
- spoľahlivé ničenie dvojkličnolistových burín vrátane problematických (pichliač, lipkavec, rumančekovité)
- široké aplikačné okno
- rýchly príjem a transport v burinách, zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvňujú účinok
- výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín, hnojivami, DAM 390, SAM a roztokom močoviny
- po zbere ošetrovanej plodiny je výsev následnej plodiny bez obmedzenia

ADAMA

Pegas Cereal

Na krídlach prosperity



Pôsobenie prípravku

Prípravok pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (1–2 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. Buriny hynú zvyčajne v rozmedzí 14–21 dní po aplikácii. Prípravok preniká do rastlín cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej syntézy (ALS) tým, že inaktivuje ALS-enzým. Účinné látky vyvolávajú typické auxínové príznaky, vrcholiace zhnednutím listov a nakoniec odumretím celej rastliny.

Spôsob použitia a termín aplikácie

Ošetrenie prípravkom je možné od obnovenia aktívneho rastu burín, pri teplotách už od 7 °C. Najlepší účinok je vo fáze 2–10 listov citlivých burín. Spoľahlivo účinkuje aj na prerastené buriny. Aplikáčné okno v registrovaných plodinách je široké, od 3. listu obilnín do 2. kolienka (BBCH 13–32). Neaplikujte pri teplote vyššej ako 25 °C.

Vďaka rýchlemu rozkladu účinných látok prípravku Pegas Cereal je možné náhradné resp. následné plodiny vysievať bez obmedzenia.

Spektrum účinku

Buriny	Účinnosť v dávke 0,6 l/ha	Buriny	Účinnosť v dávke 0,6 l/ha
parumanček nevoňavý	▲▲▲	nevädza roľná	▲▲▲
ruman roľný	▲▲▲	pichliač roľný	▲▲▲
rumanček diskovitý	▲▲▲	pestrec - výmrvm	▲▲▲
rumanček kamilkový	▲▲▲	pohánkovec ovijavý	▲▲▲
lipkavec obyčajný	▲▲▲	horčiak štiavolistý	▲▲▲
kapsička pastierska	▲▲▲	mlík biely	▲▲▲
peniažtek roľný	▲▲▲	úhorník liečivý	▲▲▲
horčica roľná	▲▲▲	mlieč roľný	▲▲▲
reďkev ohniová	▲▲▲	ostrôžka roľná	▲▲▲
hviezdica prostredná	▲▲▲	štiavce	▲▲
láskavce	▲▲▲	palina obyčajná	▲▲
slničnica - výmrvm	▲▲▲	hluchavky	▲▲
výmrvm repky	▲▲▲	veroniky	▲▲
durman obyčajný	▲▲▲	fialka roľná	▲▲
mak vlčí	▲▲▲	zemedym lekárske	▲▲

▲▲▲ veľmi dobrý účinok ▲▲ dobrý účinok ▲ nedostatočný účinok

Návod na použitie

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochr. doba
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 l 200–400 l vody	AT
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,5 l 200–400 l vody	AT



Prejav účinku na výmrvm repky



Pychliač roľný



Výborný účinok proti rumančekovitým burinám