METENAL®

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

ADAMA

MOLUSQUICIDA | **CEBO GRANULADO (GB)**

Molusquicida en forma de cebo granulado.

COMPOSICIÓN

- Metaldehído . . . . . 50 g/kg (5% p/p)
  (adicionado de colorante).

Contiene amargante, e hidróxido cálcico (CAS 1305-62-0)

Cultivos

Cítricos, frutales de hueso, alcachofa, brócoli...
(para otros cultivos ver aplicaciones autorizadas).

Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Uso profesional en espacios no destinados al público en general.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y
EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Inscrito en el R.O.F.F. con el nº 12.469

Titular del Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano Nº 29 - 2ª
28043 Madrid - Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Almacenar a menos de 35°C

L6D031TPWP_03

Escanear para más información

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

5 kg

H318 Provoca lesiones oculares graves • H317 Se sospecha que provoca una reacción alérgica en la piel • P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular a su entrada antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad • P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol • P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección • P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puedan hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado • El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas de ingestión. NO provoque el vómito a no ser bajo prescripción médica • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Si la persona está inconscientemente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las piernas semiflexionadas • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase • NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga o mano envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Por rope de trabajo se entiende: mangia largo, pantalón largo y calzado adecuado.

Seguridad del aplicador (aire libre):

Carga, limpieza y mantenimiento del equipo:

Aplicaciones mediante equipos de aplicación manual: ropa de protección resistente o productos químicos y guantes de protección químico.

Aplicación:

Aplicaciones con tractor: ropa de trabajo y guantes de protección químico.

Seguridad del aplicador (invernadero):

Aplicaciones mediante equipos de aplicación manual: ropa de protección resistente o productos químicos y guantes de protección químico.

Aplicación:

Aplicaciones con tractor: ropa de trabajo.

Carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo:

Aplicaciones mediante equipos de aplicación manual: ropa de protección químico tipo 3 o 4 (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009), calzado resistente o productos químicos y guantes de protección química.

Seguridad del trabajador:

Cumplir adecuada según la norma UNE-EN ISO 20347:2013.

Para proteger los organismos acuáticos, respetese el tratar con banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial. Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, escójase todo determe accidental. Peligroso para peces y otros animales domésticos.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado debería tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 51, 52 y 53 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evitar la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de los explotaciones o caminos).

NOTA: Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, se ha utilizados pueden intervenir numerosos factores que escapan o nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (fitotoxicidad, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

APLICACIONES AUTORIZADAS. DOSIS, MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD:

Uso molusquicida (babosas, limacos, caracoles) como medida preventiva o en invernadero, mediante espolvoreo manual. Realizar en máximo de 4 aplicaciones al aire libre, mediante espolvoreo con tractor o bien manual. Ej. cultivos al sistema convencional que al suelo este lluviado para mayor actividad. En cultivos de primo infestación. Aplicación mezclado de gránulos determinate al suelo, incorporado con un marcado entre tratamientos de 7-14 días. Evitar que el producto caiga sobre de plantas cultivadas. **Dosis:** 7 Kg/ha, excepto en algodonero, colza, girasol y haba de soja, cuya dosis es de 4 Kg/ha.

CULTIVO (Aire libre)	MOMENTO DE APLICACIÓN	P.S.
Alcachofa	Antes de la aparición del órgano floral (BBCH 00-50)	20
Apio, ajo y haba de grano*, caballo, chirivía	Antes de y o después de la aparición de la hoja desplegada (BBCH 00-19)	NP
Árboles y palmáceas de hoja ornamentales, palmáceas, palmera datilera, Cordilera y frondosas (uso ornamental)	Durante todo el ciclo vegetativo	NP
Frutales de cáscara y frutales de hueso	Antes de la brotación del fruto (BBCH <71)	7
Coliflor, chicoria, frutales de pepita	Hasta P.S.	7
Espárrago, puerro	Antes de la fase de la flor emitida o emergencia o ráquis (BBCH 00-61)	7
Fresas y frambuesas (embrión de mesa, zanahoria, chirivía, rábano y haba)	Antes de: el 25% de la flor abierta (BBCH 00-65)	20
Avena, cebada, centeno, trigo, triticale y triticum	Antes de: en del macollamiento, el máximo de ajuhados o macollos (BBCH 00-29)	60
Brócoli (broccoli), col de Bruselas, coliflor y repollo	Hasta: la inserción de las hojas, de color verde (BBCH 00-39)	21
Alcachofa (Cynara cardunculus var. scolymus), Apio (Apium graveolens var. dulce), Berza (Brassica oleracea var. sabauda), Bróculo (Brassica oleracea var. botrytis), Cardo (Cynara cardunculus var. cardunculus), Col (Brassica oleracea var. capitata), Coliflor (Brassica oleracea var. botrytis), Col de Bruselas (Brassica oleracea var. gemmifera), Col lombarda (Brassica oleracea var. capitata), Col rizada (Brassica oleracea var. sabellica), Colinabo (Brassica oleracea var. gongylodes), Nabo (Brassica rapa var. rapa), Rábano (Raphanus sativus var. sativus), Remolacha roja (Beta vulgaris var. conditiva), Remolacha de mesa (Beta vulgaris var. vulgaris), Rúcula (Eruca sativa), Zanahoria (Daucus carota var. sativus)	Antes de: las primeras hojas desplegadas (BBCH 00-19)	3
Ajo, cebolla, chalote, puerro, ajo de grano, ajo de hoja, ajo de tallo, cebolla de bulbo, cebolla de hoja, cebolla de tallo, cebolla de verdeo, cebolla de invierno, cebolla de primavera, cebolla de otoño, cebolla de invierno, cebolla de primavera, cebolla de otoño, cebolla de verdeo

350 mm

324 mm

13 13

480 480 120

60 12 24 324 48 12 12 96 12 12 48 324 24 12 60

METENAL®

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

ADAMA

MOLUSQUICIDA | **CEBO GRANULADO (GB)**

Molusquicida en forma de cebo granulado.

COMPOSICIÓN

- Metaldehído . . . . . 50 g/kg (5% p/p)
  (adicionado de colorante).

Contiene amargante, e hidróxido cálcico (CAS 1305-62-0)

Cultivos

Cítricos, frutales de hueso, alcachofa, brócoli...
(para otros cultivos ver aplicaciones autorizadas).

Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Uso profesional en espacios no destinados al público en general.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y
EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 12.469

Titular del Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano Nº 29 - 2º
28043 Madrid - Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Almacenar a menos de 35°C

L6D03bIPWP_03

Escanear para más información

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

5 kg

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS, MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD:

Uso molusquicida (babosas, limacos, caracoles) como medida preventiva o en pleno infestación. Aplicación mecánica de la granulos directamente al suelo, sembrado convenientemente que el suelo esté humedo para mejor actividad. En cultivos al aire libre, mediante espolvoreo con tractor o bien manual. En cultivos de invernaderos, mediante espolvoreo manual. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 7-14 días. Evitar que el producto caiga sobre las partes comestibles. **Dosis:** 7 kg/ha, excepto en algodonero, coles, girasol y haba en soja, cuya dosis es de 4 kg/ha.

CULTIVO (Alfa Ibérica)	MOMENTO DE APLICACIÓN	P.S.
Alcachofa	Antes de la aparición de ninguna flor (BBCH 00-50)	20
Ajo, apio y hojas de ajo*, cebolla, chalote	Antes de 6 o más hojas o antes de hojas desplegadas (BBCH 00-19)	20
Albaricoque, cerezo, ciruelo, dehesa, melocotonero, pomelo, pomelo, ciruelo, melocotonero, albaricoque, cerezo (uso ornamental)	Quince todo el ciclo vegetativo	Np
Coliflor, Coles, frutales de pepita	Antes de la formación del fruto (BBCH <71)	Np
Espárrago, perro	Hojas P.S	
Fresa y helechos (remolacha de mesa), zanahoria chirivia, nabo y nabo)	Antes de: se alcanza el 50 % del tubérculo (BBCH 00-45)	20
Kiwi, cebada, centeno, trigo, triticale y triticalum	Antes de: la mitad aproximadamente el número de hijuelos o macollos (BBCH 00-29)	60
Patata, la mayoría de las hojas, de color verde (BBCH 00-31)	Antes de las primeras lluvias por debajo del tallo terminal, fríamente	21
Berzas (brócoli, col de Bruselas, coliflor y repollo	Esparragos y helechos, flores comestibles y helechos (remolacha, zanahoria, chirivia y nabo)	3
Berza (repollo y pollos, apicales y inflorescencia, repollo", mandioca"	Antes de 6 o más hojas desplegadas (BBCH 00-19) y sinapis (colonyopo, escarola, mostaza, berbena, rucula y roquetas, mostaza china, berzas de Bruselas spp., incluidos los gelelos)	23
Cebolla, ajo y ajo	Antes de 6 o más hojas desplegadas (BBCH 00-19)	90
Cebolla, cebolleta, coliflor, repollo", repollo, alcachofa, apio, berza (repollo y pollos, apicales y inflorescencia, repollo", mandioca", repollo, cebolleta, coliflor