




A las malas hierbas les va a dar un Siroco[®].

Siroco[®], la solución de Adama que acaba con las malas hierbas sin necesidad de mezclas. Ahora podrás olvidarte de ellas durante más tiempo.

ADAMA



Siroco[®], la solución de Adama que acaba con las malas hierbas cuando ya han aparecido y sin necesidad de mezclas. Ahora podrás olvidarte de ellas durante más tiempo.

Sus características

► **Siroco[®]**, es una solución pensada para todos aquellos agricultores que buscan un enfoque sencillo para su programa de control de malas hierbas, una vez nacidas, mediante la utilización de un solo producto.



► Nuestra solución actúa en el control de malas hierbas cuando se encuentran en situación de postemergencia temprana (4-8 hojas). Cuenta con un adecuado control de las adventicias, pudiendo alcanzar remanencias superiores a los 60-90 días con las dosis recomendadas.




► Esta solución de Adama consigue la mayor remanencia en función de la dosis aplicada, del tipo de suelo y de la época del año. De este modo, en aplicaciones de otoño debido a la menor luminosidad y la presencia de humedad, la remanencia es mayor que en el caso de aplicaciones de primavera.



► **Siroco[®]** se absorbe en los 2-3 cm primeros de suelo, ya que nuestra solución forma una capa sobre la superficie del suelo tratado. Asimismo, el producto es absorbido por las hojas y se moviliza a todas las partes verdes de la planta, siendo sus resultados visibles a las 2-3 semanas de haber sido aplicado.



Modo de empleo de Siroco®



► **Siroco®**, solución de acción postemergente sobre malas hierbas perennes y anuales, gramíneas y dicotiledóneas.

Siroco® es la solución de acción postemergente más indicada para uso en cítricos



Naranja



Mandarino



Clementino




Limonero



Bergamota


Condiciones de empleo

Aplicación a todo el terreno



3-4 l/ha.

Aplicación a bandas



6 l/ha.

Momento de aplicación

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo




Siroco®



Siroco®: Amplio espectro de control sobre malas hierbas


50-60 días después de la aplicación

— Siroco® 6 L/HA



70-90 días después de la aplicación

— Siroco® 6 L/HA

























































 Excelente

 Buena

 Moderada

 Baja

 Insuficiente

<i>Especie</i>	<i>Sensibilidad 50-60</i>	<i>Sensibilidad 70-90</i>
AMARANTHUS RETROFLEXUS		
AMARANTHUS VIRIDIS		
ANARYALA INTERGRIFOLIA		
CERASTIUM GLOMERATUM		
CHENOPODIUM ALBUM		
CONVOLVULUS ARVENSIS		
CONYZA SP		
DILOTAXIS MURALIS		
ECHINOCHLOA COLONUM		
ECHINOCHLOA CRUS GALLI		
ERODIUM SPP		
EUPHORBIA POSTRATA		
GNAPHALIUM		
HELIOTROPIUM EUROPAEUM		
LACTUCA SERRIOLA		
MALVA SP		
POA ANNUA		
PORTULACA OLERACEA		
PULICARIA PALUDOSA		
SENECIO VULGARIS		
SETARIA SP		
SOLANUM NIGRUM		
SONCHUS OLERACEUS		
SONCHUS TENERRIMUS		
STELLARIA MEDIA		
TARAXACUM OFFICINALE		
TRIBULUS TERRESTRI		

Lo más destacado de Siroco®:

- ▶ Perfecto control en postemergencia temprana de las principales malas hierbas
- ▶ El producto no necesita mezclas para complementar su acción.
- ▶ Buen efecto de choque y persistencia superior frente a malas hierbas en comparación con el tratamiento con glifosato (hasta 60-90 días con las dosis recomendadas).
- ▶ La no presencia de malas hierbas facilita la realización de las labores culturales a realizar sobre el cultivo.
- ▶ Amplitud de cultivos registrados.



Volumen de caldo: 100 - 400 l/ha

Cultivos registrados	Dosis de uso	
	(aplicación en bandas)	(a todo terreno)
Cítricos (naranja, mandarina, clementino, limonero, bergamota)	4,0 -6,0 l/ha (sin superar 3,0 l/ha en el total de la superficie)	3,0 -4,0 l/ha
Frutales de hueso (melocotonero, nectarino, albaricoquero, ciruelo, cerezo)		
Manzano, peral		
Frutales de cáscara (almendro, avellano, nogal, pistacho)		
Algarrobo		
Vid de mesa y vid de vinificación		
Olivo (aceituna de mesa)	4,5 -6,0 l/ha (sin superar 4,0 l/ha en el total de la superficie)	

Antes de utilizar el producto lea detenidamente la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. SIROCO® contiene glifosato y diflufenican (R.O.P.M.F. con el nº 25.831). El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos actualizados a noviembre de 2017 y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en la etiqueta. La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.