



Tras la recolección, lo primero AGIL®



AGIL

Antigramíneo específico con REGISTRO en OLIVAR para control de vallico, bromo (o espiguilla) y cebadilla, entre otros.

AGIL®

Herbicida antigramíneo específico, con registro en olivar para control de vallico, bromo y cebadilla, entre otros.

Qué necesitas saber sobre el vallico:

Es una mala hierba anual que se reproduce por semillas.

Su dispersión se realiza a través de las labores.

Una vez enterradas, sus semillas tienen una vida menor de 18 meses.

Germinación concentrada en unos pocos días en otoño-invierno, inmediatamente después de la primera lluvia relevante.

Al tratar de eliminarlas mediante labor, pueden volver a enraizar si no se realizan labores profundas.

Existen poblaciones resistentes a glifosato.

Y cómo controlarlo:

No lo dejes nacer. Utiliza herbicidas de pre-emergencia o post-emergencia precoz con acción remanente, antes de las primeras lluvias importantes. Por ejemplo ANIBAL®.

Si no has podido realizar un tratamiento en pre-emergencia o se han escapado algunos ejemplares al tratamiento, observa periódicamente la parcela y cuando consideres que ya han nacido la mayor parte de las semillas, realiza un tratamiento en post-emergencia.

En gran parte de los campos, esto suele ocurrir tras la recolección, siendo este frecuentemente el momento idóneo para la aplicación de AGIL®.

Evita que el vallico semille. De esta manera reduciremos el número de plantas que podrán nacer el otoño siguiente.



Composición

Propaquizafop 10% p/v (100 g/l)

Formulación

Concentrado Emulsionable (EC)

Aplicación

Aplicar mediante pulverización normal dirigida al suelo, en post-emergencia precoz de las malas hierbas.

1 aplicación por campaña.

Dosis

0,5-2,0 L/ha, adecuando la dosis a la especie de gramínea y al tamaño de la misma

Volumen de caldo

200-400 l/ha

Nº de R.O.P.M.F.

19.140

Clasificación según HRAC

Grupo 1

Plazo de seguridad

No procede

**Tras la recolección,
lo primero AGIL®**

Recomendaciones de manejo de AGIL®



Utiliza altos volúmenes de agua en la aplicación, recomendable 400 l/ha agua.



La eficacia de AGIL® se reduce a partir del encañado aún en la dosis más alta (2 l/ha). Recomendamos utilizar AGIL® desde 2-3 hojas hasta final de ahijamiento (máximas eficacias).



Dejar un margen de al menos 21 días entre la aplicación de AGIL® y la de MCPA u Oxifluorfen.



Utiliza la mochila para aquellos vallicos sueltos en la parcela.



No reduzcas la dosis recomendada por el técnico y alterna AGIL® con otros herbicidas u otros medios de control con objeto de evitar resistencias futuras.

Ventajas de usar AGIL:

Especialista

- ▶ Anti-gramíneo registrado en olivar con eficacia en vallico y otras gramíneas difíciles.
- ▶ Alta selectividad para el olivo con eficacia asegurada, proporcionando tranquilidad para el olivarero.

Adaptable

- ▶ Amplio rango de dosis por hectárea, permitiendo adaptarla a la situación de cada parcela.
- ▶ Resistente al lavado: se absorbe inmediatamente (1 hora) después de la aplicación, por lo cual se adapta a diferentes situaciones climatológicas.

Completo

- ▶ Formulación con mojante incorporado.
- ▶ Amplio control de especies gramíneas (excepto *Poa annua*).



Visualiza el experimento completo en nuestro canal de YouTube ADAMA España



TUS ENVASES IMPORTAN:

- Almacena los envases en un lugar cubierto y seco.
- Enjuaga enérgicamente tres veces cada envase utilizado, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.
- En caso de bolsas y sacos, sepáralos de las garrafas y botes.
- Deposita posteriormente el envase en un punto de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO. 
- No olvides pedir el albarán de entrega en tu punto de recogida.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente su etiqueta.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El contenido del folleto tiene solamente fines informativos y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en las respectivas etiquetas.

La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.